

SURVEILLANCE DU SIDA EN FRANCE

(Situation au 30 septembre 1994) – Réseau national de Santé publique

32 722 cas de SIDA (32 178 adultes et 544 enfants) ont été enregistrés depuis le début de l'épidémie jusqu'au 30 septembre 1994. Parmi ces cas, 58,3 % sont connus comme étant décédés. Sachant que 10 à 20 % des cas ne sont pas déclarés, et qu'il existe un délai entre le diagnostic et la déclaration, le nombre de cas de SIDA serait compris entre 38 000 et 41 500.

Le nombre de nouveaux cas de SIDA continue à augmenter mais avec un taux de progression plus faible : + 4,3 % entre les 2 dernières périodes de 12 mois.

L'augmentation la plus forte est retrouvée chez les hétérosexuels : + 23,8 % entre les 2 dernières périodes de 12 mois (de 783 à 969 nouveaux cas). Le nombre de nouveaux cas est stable chez les homo/bisexuels (environ 2 200 cas sur 12 mois) et chez les toxicomanes (environ 1 400 nouveaux cas).

Cependant, le groupe des homo/bisexuels reste majoritaire au cours des 3 premiers trimestres de 1994 : il représente 39 % des cas, les toxicomanes atteignent 26 % et les hétérosexuels 18 %.


Avec moins de 1 cas de SIDA pour 10 000 habitants, le Jura, la Lozère, les Vosges et le Pas-de-Calais sont les 4 départements les moins touchés par l'épidémie.

Durant les 3 premiers trimestres de 1994, les principales pathologies d'entrée dans le SIDA sont la **pneumocystose**, le **Kaposi** (bien que la fréquence de ces 2 pathologies diminue depuis 1990), la **candidose œsophagienne**, la **toxoplasmose cérébrale** (leur fréquence reste stable), les **infections à C.M.V.** (en augmentation) et la **tuberculose pulmonaire**.

SOMMAIRE

- Tableau 1. – Cas de SIDA déclarés et diagnostiqués par année.
- Tableau 2. – Cas de SIDA décédés selon l'année du décès.
- Tableau 3. – Cas de SIDA par âge au diagnostic et sexe.
- Tableau 4. – Cas de SIDA par groupe de transmission, année de diagnostic et sexe.
- Tableau 5. – Cas de SIDA hétérosexuels partenaires de sujets infectés ou à risque par type de partenaire et année de diagnostic.
- Tableau 6. – Cas de SIDA par groupe de transmission et région de domicile.
- Tableau 7. – Nombre et taux de cas de SIDA par million d'habitants par région et département de domicile.
- Tableau 8. – Cas de SIDA pédiatriques liés à une transmission materno-fœtale par année de diagnostic.
- Tableau 9. – Pathologies indicatives de SIDA par année de diagnostic chez les adultes.

Figure 1. – Taux des cas de SIDA déclarés du 1^{er} octobre 1993 au 30 septembre 1994 par million d'habitants (France, 30 septembre 1994)



- Figure 1. – Représentation régionale du taux annuel des cas de SIDA par million d'habitants.
- Figure 2. – Histogramme des cas de SIDA déclarés et redressés par semestre de diagnostic.
- Figure 3 a. – Évolution des cas de SIDA masculins par groupe de transmission et année de diagnostic.
- Figure 3 b. – Évolution des cas de SIDA féminins par groupe de transmission et année de diagnostic.
- Figure 4. – Répartition des cas de SIDA pédiatriques par mode de transmission.
- Figure 5. – Évolution des cas de SIDA pédiatriques par année de diagnostic.
- Figure 6. – Représentation régionale des taux cumulés de cas de SIDA homo-bisexuels (a), toxicomanes (b), hétérosexuels (c), hémophiles/transfusés (d) par million d'habitants.
- Figure 7. – Courbes des fréquences des pathologies indicatives de SIDA chez les femmes par année de diagnostic.
- Figure 8. – Répartition des pathologies indicatives de SIDA chez les enfants infectés par leur mère.

Figure 2. – Cas de SIDA déclarés en France au 30 septembre 1994 et cas redressés en fonction des délais de déclaration, par semestre de diagnostic et pour le 3^e trimestre 1994




Tableau 1. – Nombre de cas de SIDA déclarés et diagnostiqués chaque année jusqu'en 1993 et au cours des 3 premiers trimestres de 1994 (France, 30 septembre 1994)

	Avant 1986	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994 3 trimestres	Total
Nombre de cas de SIDA déclarés ...	573	648	1 772	2 162	3 728	4 262	4 691	5 103	5 558	4 225	32 722
Nombre de cas de SIDA diagnostiqués ...	960	1 252	2 244	3 045	3 780	4 271	4 550	4 980*	5 392*	4 201*	34 675*

* Cas redressés par rapport au délai de déclaration.

Tableau 2. – Nombre de cas de SIDA décédés selon l'année de décès
Nombre de cas de SIDA vivants au 31 décembre de chaque année et à la fin des 3 premiers trimestres de 1994 (France, 30 septembre 1994)

	Années												Date de décès inconnue	Total	
	< 1983	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992*	1993*	1994* 3 trimestres		
Décédés par année de décès ...	10	40	99	242	551	845	1 183	1 844	2 394	2 971	3 297	3 442	2 085	–	–
Décès cumulés à la fin de chaque période	10	50	149	391	942	1 787	2 970	4 814	7 208	10 179	13 476	16 918	19 003	82	19 085
Vivants cumulés à la fin de chaque période	38	91	229	569	1 270	2 669	4 531	6 467	8 344	9 923	11 588	13 171	13 637	Taux de létalité = 58,3 %	

* Données provisoires.

Figure 3 a. – Évolution du nombre de nouveaux cas de SIDA masculins par année de diagnostic selon les principaux groupes de transmission (France, 30 septembre 1994, données redressées)




Figure 3 b. – Évolution du nombre de cas de SIDA féminins par année de diagnostic selon les principaux groupes de transmission (France, 30 septembre 1994, données redressées)




Tableau 3. – Répartition des cas de SIDA par âge au diagnostic et sexe
Cas diagnostiqués entre le 1^{er} octobre 1992 et le 30 septembre 1993, entre le 1^{er} octobre 1993 et le 30 septembre 1994 et depuis 1978 (France, 30 septembre 1994)

	Cas diagnostiqués* entre le 1 ^{er} octobre 1992 et le 30 septembre 1993			Cas diagnostiqués* entre le 1 ^{er} octobre 1993 et le 30 septembre 1994			Cas cumulés depuis 1978		
	Femmes	Hommes	Total (%)	Femmes	Hommes	Total (%)	Femmes	Hommes	Total (%)
< 5 ans	17	16	33 (0,6)	8	11	19 (0,5)	178	231	409 (1,2)
5-14 ans	10	11	21 (0,4)	2	2	4 (0,1)	45	90	135 (0,4)
15-19 ans	4	14	18 (0,4)	1	10	11 (0,3)	32	104	136 (0,4)
20-24 ans	39	84	123 (2,4)	30	69	99 (2,6)	440	1 116	1 556 (4,8)
25-29 ans	247	639	886 (17,4)	182	469	651 (17,0)	1 458	5 189	6 647 (20,3)
30-34 ans	308	1 115	1 423 (28,0)	241	841	1 082 (28,3)	1 362	6 647	8 009 (24,5)
35-39 ans	145	840	985 (19,4)	128	610	738 (19,3)	670	4 933	5 603 (17,1)
40-44 ans	80	535	615 (12,1)	61	403	464 (12,1)	372	3 490	3 862 (11,8)
45-49 ans	51	322	373 (7,3)	30	282	312 (8,2)	195	2 075	2 270 (6,9)
50-59 ans	58	331	389 (7,6)	29	240	269 (7,0)	288	2 229	2 517 (7,7)
60-69 ans	44	120	164 (3,2)	27	109	136 (3,6)	263	878	1 141 (3,5)
> 70 ans	14	43	57 (1,1)	6	28	34 (0,9)	150	287	437 (1,3)
Total	1 017	4 070	5 087 (100,0)	745	3 074	3 819 (100,0)	5 453	27 269	32 722 (100,0)
	SR = 4,0			SR = 4,1			SR = 5,0		

* Données provisoires

Tableau 4. – Répartition des cas de SIDA par groupe de transmission, année de diagnostic et sexe (France, 30 septembre 1994)

Groupe de transmission	Année de diagnostic										Cas cumulés depuis 1978		
	< 1986	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992*	1993*	1994* 3 trimestres	Femmes	Hommes	Total
1. Homo-bisexuels	615	748	1 251	1 576	1 848	2 081	2 127	2 217	2 010	1 030	0	15 503	15 503
%	(64,1)	(59,7)	(55,7)	(51,8)	(48,9)	(48,7)	(46,7)	(44,7)	(40,0)	(39,1)		(47,4)	
2. Toxicomanes	54	151	340	635	891	1 066	1 198	1 279	1 374	681	2 016	5 653	7 669
%	(5,6)	(12,1)	(15,2)	(20,9)	(23,6)	(25,0)	(26,3)	(25,8)	(27,3)	(25,9)		(23,4)	
3. (1) et (2)	25	45	56	44	76	52	58	53	39	20	0	468	468
%	(2,6)	(3,6)	(2,5)	(1,4)	(2,0)	(1,2)	(1,3)	(1,1)	(0,8)	(0,8)		(1,4)	
4. Hemophiles et troubles de la coagulation (a)	12	19	33	50	73	41	62	59	53	35	12	425	437
%	(1,3)	(1,5)	(1,5)	(1,6)	(1,9)	(1,0)	(1,4)	(1,2)	(1,1)	(1,3)		(1,3)	
5. Hétérosexuels partenaires de sujets infectés ou à risque	156	129	219	344	428	487	557	662	782	468	2 007	2 225	4 232
%	(16,3)	(10,3)	(9,8)	(11,3)	(11,3)	(11,4)	(12,2)	(13,3)	(15,6)	(17,8)		(12,9)	
6. Transfusés (b)	47	92	185	212	222	188	164	175	148	53	689	797	1 486
%	(4,9)	(7,3)	(8,2)	(7,0)	(5,9)	(4,4)	(3,6)	(3,5)	(2,9)	(2,0)		(4,5)	
7. Transmission materno-fœtale	21	23	67	54	56	58	52	42	34	12	186	233	419
%	(2,2)	(1,8)	(3,0)	(1,8)	(1,5)	(1,4)	(1,1)	(0,8)	(0,7)	(0,5)		(1,3)	
8. Autres, inconnus (c)	30	45	93	130	186	298	332	475	585	334	543	1 965	2 508
%	(3,1)	(3,6)	(4,1)	(4,3)	(4,9)	(7,0)	(7,3)	(9,6)	(11,6)	(12,7)		(7,7)	
donc : multipartenariat et/ou fréquentation de prostituées	3	6	34	50	77	123	110	135	143	80	96	665	761
Total	960	1 252	2 244	3 045	3 780	4 271	4 550	4 962	5 025	2 633	5 453	27 269	32 722
													(100,0)

* Données provisoires.

(a) Sont inclus 42 cas pédiatriques.

(b) Sont inclus 76 cas pédiatriques.

(c) Sont inclus 6 cas pédiatriques, 9 cas de contamination professionnelle chez des personnels soignants dont 8 présumés et 1 prouvé.

Figure 4. – Répartition des cas de SIDA pédiatriques en fonction du mode de transmission (France, 30 septembre 1994)




Figure 5. – Évolution du nombre de cas de SIDA pédiatriques par année de diagnostic (France, 30 septembre 1994, données redressées)




Tableau 5. – Répartition des cas de SIDA hétérosexuels partenaires de sujets infectés ou à risque, par type de partenaire et par année de diagnostic (France, 30 septembre 1994)

Type de partenaire	Année de diagnostic										Total
	< 1986	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992*	1993*	1994* 3 trimestres	
Partenaire bisexuel	0	6	6	14	19	20	20	16	14	10	125
%	(0,0)	(4,7)	(2,7)	(4,1)	(4,4)	(4,1)	(3,6)	(2,4)	(1,8)	(2,1)	(3,0)
Partenaire toxicomane	3	8	18	33	64	80	109	130	171	84	700
%	(1,9)	(6,2)	(8,2)	(9,6)	(15,0)	(16,4)	(19,6)	(19,6)	(21,9)	(17,9)	(16,5)
Partenaire hémophile	1	0	1	3	1	2	0	6	5	1	20
%	(0,6)	(0,0)	(0,5)	(0,9)	(0,2)	(0,4)	(0,0)	(0,9)	(0,6)	(0,2)	(0,5)
Partenaire transfusé	0	1	5	11	14	13	13	17	17	13	104
%	(0,0)	(0,8)	(2,3)	(3,2)	(3,3)	(2,7)	(2,3)	(2,6)	(2,2)	(2,8)	(2,5)
Partenaire séropositif (sans autre précision)	1	1	13	36	38	36	49	78	117	72	441
%	(0,6)	(0,8)	(5,9)	(10,5)	(8,9)	(7,4)	(8,8)	(11,8)	(15,0)	(15,4)	(10,4)
Partenaire originaire des Caraïbes	5	4	7	9	16	10	19	21	30	20	141
%	(3,2)	(3,1)	(3,2)	(2,6)	(3,7)	(2,1)	(3,4)	(3,2)	(3,8)	(4,3)	(3,3)
Partenaire originaire d'Afrique	23	21	33	72	65	69	56	67	97	53	556
%	(14,7)	(16,3)	(15,1)	(20,9)	(15,2)	(14,2)	(10,1)	(10,1)	(12,4)	(11,3)	(13,1)
Patient originaire des Caraïbes	61	51	75	94	133	130	118	139	115	76	992
%	(39,1)	(39,5)	(34,2)	(27,3)	(31,1)	(26,7)	(21,2)	(21,0)	(14,7)	(16,2)	(23,4)
Patient originaire d'Afrique	62	37	61	72	78	127	173	188	216	139	1 153
%	(39,7)	(28,7)	(27,9)	(20,9)	(18,2)	(26,1)	(31,1)	(28,4)	(27,6)	(29,7)	(27,2)
Total	156	129	219	344	428	487	557	662	782	468	4 232
											(100,0)

* Données provisoires.

Tableau 6. - Proportion des groupes de transmission, par région de domicile, des cas de SIDA diagnostiqués entre le 1^{er} octobre 1993 et le 30 septembre 1994* et des cas cumulés depuis 1978 (nombres entre parenthèses)
(France, 30 septembre 1994)

Régions	Homo-bisexuels	Toxico-manes	(1) et (2)	Hémophiles	Hétéro-sexuels	Transfusés	Transmission materno-fœtale	Autres, inconnus	Total	Effectif
	1	2	3	4	5	6	7	8	%	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Alsace	51,9 (52,4)	21,2 (21,1)	0,0 (0,9)	1,9 (2,4)	7,7 (8,1)	3,8 (3,9)	0,0 (0,3)	13,5 (10,8)	100 (100)	52 (332)
Aquitaine	40,7 (38,3)	33,2 (31,2)	0,5 (1,6)	2,5 (1,9)	7,5 (8,0)	2,5 (10,0)	0,5 (1,0)	12,6 (7,9)	100 (100)	199 (1 523)
Auvergne	41,2 (51,4)	32,4 (21,5)	0,0 (0,4)	0,0 (2,8)	8,8 (6,4)	2,9 (7,6)	0,0 (2,4)	14,7 (7,6)	100 (100)	34 (251)
Bourgogne	39,2 (44,8)	17,6 (23,6)	0,0 (1,2)	0,0 (1,5)	11,8 (12,9)	3,9 (5,8)	0,0 (0,6)	27,5 (9,5)	100 (100)	51 (326)
Bretagne	43,2 (46,1)	25,3 (20,2)	0,0 (1,8)	5,3 (3,1)	8,4 (12,1)	4,2 (6,1)	0,0 (0,7)	13,7 (9,9)	100 (100)	95 (555)
Centre	31,0 (46,7)	22,6 (17,0)	1,2 (1,2)	0,0 (2,9)	23,8 (15,2)	2,4 (7,0)	1,2 (0,6)	17,9 (9,4)	100 (100)	84 (512)
Champagne - Ardenne	36,1 (38,0)	13,9 (16,6)	2,8 (2,2)	0,0 (2,6)	19,4 (12,9)	2,8 (11,4)	0,0 (1,1)	25,0 (15,1)	100 (100)	36 (271)
Corse	28,6 (19,3)	47,6 (54,2)	0,0 (4,2)	0,0 (0,0)	9,5 (7,8)	0,0 (2,4)	4,8 (3,6)	9,5 (8,4)	100 (100)	21 (166)
Franche-Comté	41,2 (50,0)	23,5 (23,0)	0,0 (1,1)	0,0 (1,7)	29,4 (11,5)	0,0 (6,3)	0,0 (1,7)	5,9 (4,6)	100 (100)	17 (174)
Île-de-France	42,4 (55,8)	24,3 (19,4)	0,8 (1,4)	0,6 (0,8)	18,3 (11,3)	1,6 (3,3)	0,5 (0,9)	11,6 (7,1)	100 (100)	1 545 (15 407)
Languedoc - Roussillon	50,4 (48,5)	23,7 (25,9)	1,5 (1,5)	2,3 (2,1)	6,9 (7,9)	0,8 (3,6)	0,0 (1,9)	14,5 (8,7)	100 (100)	131 (1 093)
Limousin	46,7 (46,6)	30,0 (22,2)	0,0 (0,5)	3,3 (2,1)	13,3 (6,9)	0,0 (7,4)	0,0 (3,2)	6,7 (11,1)	100 (100)	30 (189)
Lorraine	37,9 (50,1)	20,7 (15,3)	3,4 (1,9)	3,4 (3,0)	10,3 (10,4)	0,0 (9,0)	6,9 (1,4)	17,2 (9,0)	100 (100)	29 (367)
Midi - Pyrénées	43,0 (44,7)	31,8 (29,4)	1,3 (1,7)	1,3 (2,1)	7,3 (8,4)	0,0 (4,1)	0,0 (1,8)	15,2 (7,8)	100 (100)	151 (1 086)
Nord - Pas-de-Calais	55,1 (54,0)	14,3 (15,3)	0,0 (1,1)	0,0 (1,8)	18,4 (13,8)	2,0 (4,9)	0,0 (1,3)	10,2 (7,8)	100 (100)	49 (450)
Basse-Normandie	39,7 (37,9)	22,4 (29,4)	3,4 (1,2)	6,9 (4,9)	12,1 (10,1)	5,2 (5,5)	0,0 (1,5)	10,3 (9,5)	100 (100)	58 (327)
Haute-Normandie	38,0 (44,1)	24,0 (14,9)	0,0 (1,5)	4,0 (4,1)	16,0 (15,9)	6,0 (8,5)	2,0 (1,5)	10,0 (9,5)	100 (100)	50 (410)
Pays de la Loire	46,9 (46,6)	12,5 (16,3)	0,0 (1,7)	3,1 (5,2)	15,6 (11,7)	4,2 (5,5)	1,0 (1,4)	16,7 (11,6)	100 (100)	96 (639)
Picardie	42,2 (42,3)	22,2 (17,3)	0,0 (1,5)	0,0 (1,8)	13,3 (14,6)	8,9 (11,3)	0,0 (1,2)	13,3 (10,1)	100 (100)	45 (336)
Poitou - Charentes	29,6 (44,9)	27,8 (19,7)	0,0 (1,0)	3,7 (1,7)	13,0 (11,2)	13,0 (11,2)	1,9 (1,5)	11,1 (8,7)	100 (100)	54 (401)
Provence - Alpes - Côte d'Azur	27,5 (32,7)	43,3 (44,4)	0,5 (1,7)	1,0 (1,0)	12,8 (7,7)	1,9 (4,9)	0,3 (1,3)	12,6 (6,3)	100 (100)	578 (4 405)
Rhône - Alpes	44,0 (52,5)	19,5 (21,9)	0,8 (1,6)	0,8 (1,6)	15,8 (9,8)	2,5 (2,3)	0,4 (0,8)	16,2 (9,4)	100 (100)	241 (1 591)
Antilles - Guyane	10,7 (12,8)	3,3 (4,4)	0,8 (0,4)	0,8 (0,2)	77,0 (67,3)	2,5 (2,6)	2,5 (5,7)	2,5 (6,6)	100 (100)	122 (1 201)
Réunion	28,6 (36,9)	0,0 (18,0)	0,0 (0,0)	0,0 (1,8)	42,9 (21,6)	14,3 (7,2)	14,3 (3,6)	0,0 (10,8)	100 (100)	7 (111)
Domicile à l'étranger ou inconnu	27,3 (39,2)	15,9 (13,9)	0,0 (0,8)	0,0 (0,5)	43,2 (31,7)	2,3 (5,5)	0,0 (1,3)	11,4 (7,0)	100 (100)	44 (599)
Total	38,9 (47,4)	26,3 (23,4)	0,8 (1,4)	1,2 (1,3)	17,3 (12,9)	2,3 (4,5)	0,6 (1,3)	12,6 (7,7)	100 (100)	3 819 (32 722)

*Données provisoires

Figure 6 a. - Taux de cas de SIDA cumulés depuis 1978 chez les homosexuels-bisexuels par million d'habitants
(France, 30 septembre 1994)




Figure 6 b. - Taux de cas de SIDA cumulés depuis 1978 chez les toxicomanes par million d'habitants
(France, 30 septembre 1994)




Tableau 7. – Nombre de cas de SIDA par département et région de domicile, déclarés entre le 1^{er} octobre 1993 et le 30 septembre 1994 et depuis 1978, et taux par million d'habitants (France, 30 septembre 1994)

Départements Régions	Cas de SIDA déclarés du 1/10/1993 au 30/9/1994		Cas de SIDA cumulés 1978-1994		Départements Régions	Cas de SIDA déclarés du 1/10/1993 au 30/9/1994		Cas de SIDA cumulés 1978-1994	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux		Nombre	Taux	Nombre	Taux
67	35	36,7	221	231,9	54	25	35,1	160	224,7
68	28	41,7	111	165,4	55	3	15,3	23	117,3
Alsace	63	38,8	332	204,4	57	25	24,7	151	149,4
24	20	51,8	117	303,1	88	6	15,5	33	85,5
33	182	150,0	856	705,7	Lorraine	59	25,6	367	159,2
40	22	70,7	105	337,6	9	8	58,8	31	227,9
47	19	62,1	103	336,6	12	7	25,9	42	155,6
64	78	134,7	342	590,7	31	175	189,0	731	789,4
Aquitaine	321	114,8	1 523	544,9	32	11	62,9	40	228,6
3	9	25,1	57	159,2	46	8	51,3	38	243,6
15	3	18,9	18	113,2	65	21	93,3	63	280,0
43	3	14,5	21	101,4	81	14	40,8	70	204,1
63	28	46,8	155	259,2	82	9	45,0	71	355,0
Auvergne	43	32,5	251	189,9	Midi - Pyrénées	253	104,1	1 086	446,7
21	20	40,5	120	242,9	59	51	20,1	350	138,2
58	11	47,2	44	188,8	62	24	16,7	100	69,8
71	17	30,4	77	137,7	Nord - P.-d.-Calais	75	18,9	450	113,5
89	18	55,7	85	263,2	14	52	84,1	220	356,0
Bourgogne	66	41,0	326	202,6	50	7	14,6	57	118,8
22	17	31,6	82	152,4	61	9	30,7	50	170,6
29	39	46,5	170	202,6	Basse-Normandie	68	48,9	327	235,1
35	43	53,8	168	210,3	Haute-Normandie	86	49,5	410	236,0
56	35	56,5	135	217,7	Pays de Loire	146	47,7	639	208,9
Bretagne	134	47,9	555	198,5	44	73	69,4	307	291,8
18	18	55,9	57	177,0	49	36	51,0	149	211,0
28	13	32,8	80	202,0	53	11	39,6	34	122,3
36	6	25,2	33	138,7	72	18	35,0	88	171,2
37	29	54,8	134	253,3	85	8	15,7	61	119,8
41	21	68,6	68	222,2	Pays de Loire	146	47,7	639	208,9
45	30	51,6	140	241,0	2	26	48,4	86	160,1
Centre	117	49,3	512	215,9	60	33	45,5	193	265,8
8	9	30,4	37	125,0	80	7	12,8	57	104,0
10	23	79,6	88	304,5	Picardie	66	36,4	336	185,5
51	16	28,7	111	198,9	16	17	49,7	88	257,3
52	5	24,5	35	171,6	17	27	51,2	154	292,2
Champagne- Ardenne	53	39,3	271	201,0	79	15	43,4	58	167,6
2 A	17	144,1	72	610,2	86	21	55,3	101	265,8
2 B	12	90,9	94	712,1	Poitou - Charentes	80	50,2	401	251,4
Corse	29	116,0	166	664,0	4	15	114,5	63	480,9
25	13	26,8	94	193,8	5	12	106,2	50	442,5
39	5	20,1	24	96,4	6	320	329,2	1 850	1 903,3
70	6	26,1	26	113,0	13	276	156,9	1 649	937,5
90	6	44,8	30	223,9	83	96	117,8	498	611,0
Franche-Comté	30	27,3	174	158,6	84	43	92,1	295	631,7
75	1 126	523,2	7 992	3 713,8	Provence - Alpes- Côte d'Azur	762	179,0	4 405	1 034,8
77	113	104,8	552	512,1	1	19	40,3	81	172,0
78	146	111,7	685	524,1	7	11	39,6	47	169,1
91	118	108,8	661	609,2	26	17	41,1	89	215,0
92	284	204,0	1 712	1 229,9	38	62	61,0	263	258,9
93	304	220,1	1 722	1 246,9	42	30	40,2	127	170,2
94	254	208,9	1 370	1 126,6	69	141	93,4	633	419,5
95	113	107,6	713	679,0	73	15	43,1	82	235,6
Île-de-France	2 458	230,6	15 407	1 445,2	74	48	84,5	269	473,6
11	15	50,2	124	414,7	Rhône - Alpes	343	64,1	1 591	297,4
30	52	88,9	275	470,1	971	110	284,2	491	1 268,7
34	83	104,4	485	610,1	972	46	127,8	297	825,0
48	0	0,0	7	95,9	973	56	487,0	413	3 591,3
66	38	104,4	202	554,9	974	16	26,8	111	185,6
Languedoc- Roussillon	188	88,9	1 093	516,8	D.O.M.	228	156,2	1 312	898,6
19	14	58,8	49	205,9	MÉTROPOLE ET D.O.M.	5 707	98,4	32 123	554,1
23	8	61,1	22	167,9	Domicile à l'étranger	76		569	
87	17	48,0	118	333,3	Domicile inconnu	0		30	
Limousin	39	53,9	189	261,4					

Figure 6 c. – Taux de cas de SIDA cumulés depuis 1978 chez les hétérosexuels par million d'habitants (France, 30 septembre 1994)




Figure 6 d. – Taux de cas de SIDA cumulés depuis 1978 chez les hémophiles et transfusés par million d'habitants (France, 30 septembre 1994)





Tableau 8. - Répartition des cas de SIDA liés à une transmission materno-fœtale par année de diagnostic (France, 30 septembre 1994)

Groupe de transmission	Année de diagnostic										Total
	< 1986	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992*	1993*	1994*	
1. Mère toxicomane	1 % (4,8)	4 % (17,4)	35 % (52,2)	24 % (44,4)	23 % (41,1)	20 % (34,5)	16 % (30,8)	12 % (28,6)	13 % (38,2)	2 % (16,7)	150 (35,8)
2. Mère transfusée	0 % (0,0)	1 % (4,3)	4 % (6,0)	0 % (0,0)	2 % (3,6)	1 % (1,7)	3 % (5,8)	2 % (4,8)	1 % (2,9)	0 % (0,0)	14 (3,3)
3. Mère avec contact hétérosexuel	19 % (90,5)	17 % (73,9)	28 % (41,8)	26 % (48,1)	27 % (48,2)	36 % (62,1)	29 % (55,8)	23 % (54,8)	17 % (50,0)	9 % (75,0)	231 (55,1)
4. Mère à risque inconnu	1 % (4,8)	1 % (4,3)	0 % (0,0)	4 % (7,4)	4 % (7,1)	1 % (1,7)	4 % (7,7)	5 % (11,9)	3 % (8,8)	1 % (8,3)	24 (5,7)
Total	21 % (100,0)	23 % (100,0)	67 % (100,0)	54 % (100,0)	56 % (100,0)	58 % (100,0)	52 % (100,0)	42 % (100,0)	34 % (100,0)	12 % (100,0)	419 (100,0)

* Données provisoires

Figure 7. - Évolution de la fréquence* des principales pathologies (isolées) indicatives de SIDA chez les femmes adultes (France, 30 septembre 1994, données redressées)



* Fréquence par rapport à l'ensemble des pathologies d'entrée dans le SIDA chez les femmes, isolées et associées, à l'exclusion des pathologies ajoutées par la définition de 1993.

Figure 8. - Répartition des principales pathologies opportunistes (isolées) indicatives de SIDA parmi les cas de contamination materno-fœtale (France, 30 septembre 1994)




Tableau 9. - Fréquence des pathologies opportunistes (1) chez les cas de SIDA adultes par année de diagnostic (France, 30 septembre 1994)

Critères de 1985	<1986 n = 921	1986 n = 1 220	1987 n = 2 160	1988 n = 2 973 (n = 2 650)	1989 n = 3 711 (n = 3 245)	1990 n = 4 201 (n = 3 666)	1991 n = 4 486 (n = 3 890)	1992* n = 4 902 (n = 4 180)	1993* n = 4 984 (n = 4 645)	1994* n = 2 620 (n = 2 123)	Total n = 32 178 (n = 27 821)
Pneumonie à <i>Pneumocystis carinii</i>	27,4	32,0	34,9	35,2 (39,5)	33,7 (38,6)	29,6 (33,9)	28,3 (32,6)	24,5 (28,7)	21,4 (26,8)	20,7 (25,5)	28,0 (32,4)
Kaposi	34,1	27,7	23,0	19,7 (22,2)	17,5 (20,0)	18,3 (21,0)	17,0 (19,6)	15,6 (18,3)	13,8 (17,3)	12,1 (15,0)	17,7 (20,4)
Candidose de l'œsophage	18,9	23,7	21,7	16,9 (18,9)	14,8 (16,9)	13,6 (15,6)	12,7 (14,6)	12,8 (15,0)	13,8 (17,4)	14,7 (18,2)	15,0 (17,3)
Toxoplasmose cérébrale	10,7	10,6	10,5	11,4 (12,8)	13,4 (15,3)	15,8 (18,1)	15,9 (18,3)	16,1 (18,9)	12,7 (15,9)	12,1 (14,9)	13,7 (15,8)
Infection à C.M.V.	7,6	8,0	5,6	4,8 (5,4)	4,6 (5,3)	5,1 (5,8)	5,4 (6,2)	6,3 (7,4)	6,1 (7,7)	7,3 (8,9)	5,8 (6,7)
Cryptosporidiose	6,3	7,0	7,5	3,9 (4,4)	3,6 (4,1)	3,4 (3,8)	3,5 (4,1)	3,7 (4,3)	4,6 (5,7)	4,4 (5,4)	4,3 (5,0)
Lymphomes	3,9	5,2	3,1	3,5 (3,9)	3,5 (4,0)	3,6 (4,1)	3,8 (4,4)	4,9 (5,8)	4,3 (5,3)	4,4 (5,5)	4,0 (4,7)
Infection à H.S.V.	8,8	6,6	4,9	2,1 (2,3)	1,5 (1,7)	1,8 (2,0)	1,8 (2,1)	1,7 (1,9)	1,9 (2,4)	2,4 (3,0)	2,4 (2,8)
Cryptococose extra-pulmonaire	3,5	2,9	2,5	1,4 (1,6)	1,9 (2,2)	2,1 (2,5)	2,5 (2,9)	2,5 (2,9)	1,8 (2,2)	2,3 (2,9)	2,2 (2,5)
Infection à mycobactéries atypiques	1,5	1,6	1,7	0,8 (0,9)	1,1 (1,2)	1,5 (1,7)	2,2 (2,5)	3,0 (3,5)	4,4 (5,5)	4,4 (5,4)	2,4 (2,8)
L.E.M.P.	0,7	0,8	0,8	0,5 (0,5)	0,5 (0,6)	1,0 (1,1)	1,4 (1,6)	1,6 (1,9)	2,6 (3,2)	2,7 (3,3)	1,4 (1,6)
Critères de 1987		1988 n = 2 973	1989 n = 3 711	1990 n = 4 201	1991 n = 4 486	1992* n = 4 902	1993* n = 4 984 [n = 4 645]	1994* n = 2 620 [n = 2 123]			Total n = 27 877 [n = 27 260]
Encéphalopathie due au V.I.H.		5,8	6,4	5,6	5,6	5,6	5,3 [5,7]	4,7 [5,2]			5,6 [5,7]
Infection à <i>Mycobacterium tuberculosis</i> extra-pulmonaire		5,2	5,9	5,9	5,7	5,8	5,3 [5,7]	5,6 [6,0]			5,6 [5,8]
Syndrome cachectique		2,4	2,9	3,4	4,1	5,3	4,5 [4,8]	3,4 [3,6]			3,9 [4,0]
Critères de 1993							1993* n = 4 984	1994* n = 2 620			Total n = 7 604
Tuberculose pulmonaire								6,0	6,4		6,3

* Données provisoires.

n Nombre total de cas diagnostiqués.

(n) Nombre de cas diagnostiqués selon la définition de 1985.

[n] Nombre de cas diagnostiqués selon la définition de 1987.

(1) Pathologies dont la fréquence est supérieure à 1%.

ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE ET DES-CRIPITION DE LA NOTIFICATION AU RÉSEAU NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE (R.N.S.P.).

Le système de surveillance du SIDA, mis en place en 1982, repose sur la déclaration obligatoire faite par les praticiens (décret du 10 juin 1986). La déclaration est basée sur la définition O.M.S./C.D.C. du SIDA, révisée en 1993 (B.E.H. n° 51/1987 et 11/1993).

Le décès d'un cas de SIDA, en vertu de l'article L.12 du Code de la Santé publique est à déclaration obligatoire.

La surveillance est coordonnée au niveau du département par le médecin inspecteur de la Santé publique et au niveau national par le R.N.S.P.

La situation du SIDA en France est publiée chaque trimestre dans le B.E.H.. Des documents régionaux contenant des tableaux détaillés par département et hôpital ayant déclaré plus de 20 cas sur les 4 derniers semestres, sont publiés chaque semestre et disponibles auprès des médecins inspecteurs des D.D.A.S.S.

La distribution des délais de déclaration (délai entre le diagnostic du SIDA et l'enregistrement au R.N.S.P.) pour les 1 378 cas enregistrés au cours du 3^e trimestre de 1994 est la suivante : 30 % ont été déclarés durant le trimestre de diagnostic, 39 % ont été déclarés avec un trimestre de retard, 20 % avec 2 ou 3 trimestres de retard et 11 % un an ou plus après le diagnostic.

Au cours de ce trimestre, 11 % des questionnaires reçus concernaient des cas déjà déclarés et 2 % ne correspondaient pas aux critères actuels de la définition du SIDA, 13 % des déclarations reçues n'ont donc pas été retenues.

PRÉSENTATION DES DONNÉES

Les délais de déclaration : Les cas sont déclarés avec un certain délai, dont on tient compte en corrigeant (ou « redressant ») les données des années récentes. Ceci est réalisé à l'aide d'un modèle mathématique [1], qui utilise la distribution des délais de déclaration des cas déjà déclarés. Les redressements sont effectués sur 8 trimestres de déclaration et portent par conséquent sur les données du 4^e trimestre de 1992, de l'année 1993 et des 3 premiers trimestres de 1994.

Le redressement des données par rapport aux délais de déclaration a permis d'estimer à 34 675 (32 722 + 1 953) le nombre de cas cumulés au 30 septembre 1994 (fig. 2).

L'analyse des tendances (en effectifs) n'est possible qu'à partir de données redressées. Plusieurs figures permettent d'interpréter des tendances au cours du temps : l'évolution du nombre de nouveaux cas selon le groupe de transmission (fig. 3) et l'évolution du nombre de nouveaux cas de SIDA pédiatriques (fig. 5).

Les décès des cas de SIDA sont sous-déclarés, le taux de létalité de 58,3 % (nombre de cas décédés/nombre total de cas) est donc sous-estimé.

L'âge regroupé en classes de 5 ou 10 ans, représente l'âge au moment du diagnostic du SIDA. La distinction adulte/cas pédiatrique est basée sur l'âge au diagnostic du SIDA, les sujets considérés comme adultes ont 15 ans ou plus au moment du diagnostic.

Les catégories d'exposition au risque, ou groupes de transmission, sont hiérarchisées de 1 à 6. Chaque cas est classé dans un seul groupe. Les sujets présentant plusieurs risques sont classés dans le groupe de

transmission listé le premier dans la hiérarchie, sauf pour les sujets à la fois homosexuels et toxicomanes pour lesquels il existe un groupe spécifique.

La catégorie 5 « Hétérosexuels partenaires de sujets infectés ou à risque » rassemble les sujets ayant un partenaire sexuel à risque, qu'il soit bisexuel, toxicomane, hémophile, transfusé, originaire d'Afrique sub-saharienne ou des Caraïbes, les sujets ayant un partenaire séropositif sans autre précision et les sujets originaires d'Afrique sub-saharienne ou des Caraïbes.

La catégorie 7 « Transmission materno-fœtale » regroupe les enfants nés de mère séropositive.

La catégorie 8 « Autres, inconnus » rassemble des sujets pour lesquels le mode de contamination ne peut être connu (décédé ou perdu de vue), des sujets pour lesquels aucune situation à risque décrite dans les catégories 1 à 6 n'a pu être évoquée, des sujets dont le mode de contamination est en cours d'investigation et des personnels soignants contaminés dans l'exercice de leur profession.

Les cas pour lesquels la notion de fréquentation de prostitué(e)s et/ou de multipartenariat est connue, sont détaillés dans le tableau 4 (voir B.E.H. n° 6/1993).

Le regroupement des cas par département ou région est fait selon le domicile du patient et non selon le lieu de prise en charge médicale.

Les effectifs par région des tableaux 6 et 7 diffèrent, le tableau 6 est réalisé à partir des cas **diagnostiqués** sur les 12 derniers mois, alors que le tableau 7 est réalisé à partir des cas **déclarés** sur les 12 derniers mois.

Les taux de cas de SIDA par million d'habitants sont établis à partir des données de population issues du recensement de 1990; les taux annuels font référence à l'année de recueil et non à l'année de diagnostic.

La première pathologie opportuniste indicative de SIDA et celles diagnostiquées éventuellement dans un délai de 1 mois sont prises en compte. Les pathologies observées ne représentent que le mode d'entrée dans le SIDA, les patients pouvant présenter d'autres pathologies au cours de la maladie.

La fréquence annuelle de chaque pathologie est calculée par rapport à 2 dénominateurs différents (tab. 9). D'une part, chaque pathologie est rapportée à l'ensemble des cas diagnostiqués dans l'année, selon la définition en cours. D'autre part, afin d'analyser les tendances, les pathologies correspondant aux anciens critères (définition 1985, définition 1987) sont rapportées au nombre de cas diagnostiqués dans l'année selon ces mêmes critères (chiffres entre parenthèses ou entre crochets).

Les patients pouvant présenter plusieurs pathologies opportunistes, la somme des fréquences par année de diagnostic est supérieure à 100 %.

Depuis la révision de la définition en janvier 1993, 476 tuberculoses pulmonaires, 159 pneumopathies bactériennes récurrentes et 39 cancers invasifs du col ont été rapportés.

[1] HEISTERKAMP (S.H.), JAGER (J.-C.), RUITENBERG (E.-J.), VAN DRU-
TEN (J.A.M.), DOWNS (A.-M.). – **Correcting reported AIDS**
incidence : a statistical approach. – *Stat Med* 1989, 8 : 963-76.

Cas déclarés pour certaines maladies transmissibles

Données provisoires non validées

Sémaine du 24
au 30 octobre 1994

RÉGIONS	DÉPARTEMENTS	POPULATION EN 1990	Typho/Paratypho.	SIDA	Méningite à méningocoques	Brucellose	Tétanos	Tuberculose	T.I.A.C.	Boulimie	Légonellose	Poliomyalgie	RÉGIONS	DÉPARTEMENTS	POPULATION EN 1990	Typho/Paratypho.	SIDA	Méningite à méningocoques	Brucellose	Tétanos	Tuberculose	T.I.A.C.	Boulimie	Légonellose	Poliomyalgie	
ALSACE	67 Rhin (Bas-)	953 053											LIMOUSIN	19 Corrèze	237 908											
	68 Rhin (Haut-)	671 319								1		1		23 Creuse	131 349											
	Total	1 624 372								1		1		87 Vienne (Haute-)	353 593											
AQUITAINE	24 Dordogne	386 365		1						1			LORRAINE	Total	722 850											
	33 Gironde	1 213 499		11										54 Meurthe-et-Mos.	711 822											
	40 Landes	311 461												55 Meuse	196 344											
	47 Lot-et-Garonne	305 989		1										57 Moselle	1 011 302											1
	64 Pyrénées-Atlant.	578 516												88 Vosges	386 258											
AUVERGNE	Total	2 795 830		13						2			MIDI-PYRÉNÉES	Total	2 305 726											
	03 Allier	357 710												09 Ariège	136 455											
	15 Cantal	158 723												12 Aveyron	270 141											
	43 Loire (Haute-)	206 568												31 Gironde (Hte-)	925 962											5
	63 Puy-de-Dôme	598 213		1						1				32 Gers	174 587											1
BOURGOGNE	Total	1 321 214		1						1			MIDI-PYRÉNÉES	46 Lot	155 816											
	21 Côte-d'Or	493 866			1									65 Pyrénées (Htes-)	224 759		3									
	58 Nièvre	233 278												81 Tarn	342 723											
	71 Saône-et-Loire	559 413												82 Tarn-et-Gar.	200 220											
	89 Yonne	323 096												Total	2 430 663		3									6
BRETAGNE	Total	1 609 653		1									NORD-PAS-DE-CALAIS	59 Nord	2 531 855											
	22 Côtes-d'Armor	538 395		1						2				62 Pas-de-Calais	1 433 203		4									2
	29 Finistère	838 687												Total	3 955 058		4									
	35 Ille-et-Vilaine	798 718		1						1			NORMANDIE (BASSE-)	14 Calvados	618 478											
	56 Morbihan	619 838		2										50 Manche	479 636											2
CENTRE	Total	2 795 638		4						3				61 Orne	293 204											
	18 Cher	321 559											NORMANDIE (HAUTE-)	Total	1 391 318											2
	28 Eure-et-Loir	396 073												27 Eure	513 818											4
	36 Indre	237 510												76 Seine-Maritime	1 223 429											
	37 Indre-et-Loire	529 345								1			PAYS DE LA LOIRE	Total	1 737 247											4
CHAMPAGNE-ARDENNE	41 Loir-et-Cher	305 937								2				44 Loire-Atlant.	1 052 183											
	45 Loiret	580 612		1						3				49 Maine-et-Loire	705 882											1
	Total	2 371 036		1						6				53 Mayenne	278 037											
	08 Ardennes	296 357		1						1				72 Sarthe	513 654		6									
	10 Aube	289 207	1							1		1		85 Vendée	509 356											
CORSE	52 Marne (Haute-)	204 067											PICARDIE	Total	3 059 112		6									1
	Total	1 347 848	1	1						2		1		02 Aisne	537 259											1
	2 A Corse-du-Sud	118 174								3	1			60 Oise	725 603											
	2 B Corse (Haute-)	131 563												80 Somme	547 825											
	Total	249 737								3	1			Total	1 810 687											1
FRANCHE-COMTÉ	25 Doubs	484 770											POITOU-CHARENTES	16 Charente	341 993		2									
	39 Jura	248 759												17 Charente-Mar.	527 146			1								1
	70 Saône (Haute-)	229 650								2				79 Sèvres (Deux-)	345 965											2
	90 Terr. de Belfort	134 097												86 Vienne	379 977		1									
	Total	1 097 276								2				Total	1 595 081		3	1								3
ÎLE-DE-FRANCE	75 Paris (Ville)	2 152 423		32						24		2	PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR	04 Alpes-Hte-Prov.	130 883											
	77 Seine-et-Marne	1 078 166								Non reçu				05 Alpes (Hauts-)	113 300			1								
	78 Yvelines	1 307 150		1	2					2				06 Alpes-Marit.	971 829											
	91 Essonne	1 084 824								Non reçu				13 B.-du-Rhône	1 759 371		2	1								9
	92 Hauts-de-Seine	1 391 658								Non reçu				83 Var	815 449			1								
LANGUEDOC-ROUSSILLON	93 Seine-St-Denis	1 381 197		8						14			RHÔNE-ALPES	84 Vaucluse	467 075											
	94 Val-de-Marne	1 215 538								Non reçu				Total	4 257 907		2	3								9
	95 Val-d'Oise	1 049 598		2						6				01 Ain	471 019											
	Total	10 660 554	1	44						46		2		07 Ardèche	277 581											
	11 Aude	298 712								Non reçu				26 Drôme	414 072											
FRANCE OUTRE-MER	30 Gard	585 049								Non reçu				38 Isère	1 016 228		5									2
	34 Hérault	794 603								Non reçu				42 Loire	746 288											
	48 Lozère	72 825												69 Rhône	1 508 966											
	66 Pyrénées-Orient.	363 796												73 Savoie	348 261											4
	Total	2 114 985												74 Savoie (Haute-)	568 286											
FRANCE OUT																										