

Une erreur s'est glissée dans l'article [Connaissances et pratiques de prévention contre la borréliose de Lyme et les piqûres de tiques en France métropolitaine : Baromètre santé 2019 et 2016](#) (Septfons et coll.), paru dans le BEH n° 5 du 22 février 2022.

En effet, dans le tableau 3, les intitulés des 3 derniers items étaient erronés (page 104).

Vous trouverez ci-dessous le tableau corrigé.

Tableau 3

Facteurs associés à l'utilisation des moyens de protection contre piqûres de tiques et la borréliose de Lyme chez les personnes âgées de 18 à 85 ans en France métropolitaine, Baromètre Santé 2019

	Utilisation de répulsifs			Porter des vêtements longs			Inspection du corps et retrait de la tique			Au moins une des trois mesures <sup>e</sup>			Porter des vêtements longs et inspecter son corps		
	n=2 707			n=2 702			n=2 688			n=2 558			n=2 707		
	%	ORa	IC95%	%	ORa	IC95%	%	ORa	IC95%	%	ORa	IC95%	%	ORa	IC95%
<b>Sexe</b>															
Homme	13%	réf		73%	réf		50%	réf		82%	réf		41%	réf	
Femme	22%	1,4***	1,2	75%	1,0	0,9	55%	1,1	1,0	84%	1,0	0,7	46%	1,1	1,0
<b>Âge (années)</b>															
18-24	13%	réf		58%	réf		46%	réf		71%	réf		34%	réf	
25-34	16%	1,3	0,6	72%	1,6	0,9	56%	1,0	0,6	81%	1,4	0,8	47%	1,2	0,7
35-44	18%	1,4	0,7	72%	1,7*	1,0	59%	1,0	0,6	83%	1,7	0,9	48%	1,2	0,7
45-54	18%	1,4	0,7	69%	1,4	0,8	54%	0,8	0,5	81%	1,3	0,7	43%	0,9	0,5
55-64	19%	1,5	0,8	79%	2,2**	1,3	54%	0,8	0,5	87%	2,0*	1,1	3,6	1,1	0,6
65-74	19%	1,5	0,8	81%	2,5***	1,5	51%	0,7	0,4	89%	2,5**	1,4	4,6	0,8	0,5
75-85	13%	1,0	0,4	76%	1,8	1,0	35%	0,3**	0,2	80%	1,2	0,6	32%	0,5	0,3
<b>Zone d'incidence</b>															
Basse incidence	17%	réf		73%	réf		46%	réf		81%	réf		39%	réf	
Moyenne incidence	16%	0,9	0,6	68%	0,7*	0,5	60%	1,4	1,0	82%	0,9	0,6	1,4	1,0	0,8
Haute incidence	19%	1,1	0,8	77%	1,0	0,8	63%	1,6***	1,2	88%	1,2	0,9	1,7	1,4**	1,1
<b>Diplôme</b>															
< Bac	19%	réf		77%	réf		51%	réf		85%	réf		44%	réf	
Bac ou équivalent	16%	0,8	0,6	69%	0,7	0,6	50%	0,8	0,6	80%	0,7	0,5	1,0	0,7*	0,6
> Bac	16%	0,8	0,5	72%	0,8	0,6	58%	1,3	1,0	83%	1,0	0,7	1,4	1,0	0,8
<b>Revenu</b>															
1 <sup>er</sup> tercile (bas)	21%	réf		75%	réf		55%	réf		85%	réf		45%	réf	
2 <sup>e</sup> tercile	17%	0,8	0,6	72%	0,8	0,6	55%	0,9	0,7	81%	0,7*	0,5	0,9	1,0	0,8
3 <sup>e</sup> tercile (haut)	14%	0,7*	0,5	73%	0,8	0,6	52%	0,9	0,6	84%	0,9	0,6	1,3	0,8	0,6
Refus	17%	0,8	0,5	75%	1,0	0,7	44%	0,7	0,5	83%	0,9	0,5	1,4	0,8	0,5
<b>Taille d'unité urbaine</b>															
Agglomération parisienne	24%	réf		68%	réf		39%	réf		78%	réf		33%	réf	
Rural	16%	0,5*	0,3	75%	1,2	0,7	58%	1,4	0,9	85%	1,1	0,7	2,0	1,3	0,8
<20 000 habitants	18%	0,6	0,3	72%	1,0	0,6	52%	1,3	0,8	81%	0,9	0,5	1,6	1,2	0,7
20 000 – 99 999 habitants	20%	0,6	0,3	76%	1,3	0,8	53%	1,4	0,8	87%	1,4	0,7	2,6	1,3	0,8
100 000 – 199 999 habitants	22%	0,8	0,4	83%	2,2*	1,1	66%	2,9**	1,4	90%	2,6*	1,0	6,6	2,8**	1,4
≥200 000 habitants	15%	0,5*	0,3	70%	1,1	0,7	44%	1,1	0,7	78%	0,9	0,5	1,6	1,1	0,7



Tableau 3 (suite)

	Utilisation de répulsifs n=2 707			Porter des vêtements longs n=2 702			Inspection du corps et retrait de la tique n=2 688			Au moins une des trois mesures <sup>§</sup> n=2 558			Porter des vêtements longs et inspecter son corps n=2 707		
	%	ORa	IC95%	%	ORa	IC95%	%	ORa	IC95%	%	ORa	IC95%	%	ORa	IC95%
<b>Catégorie socioprofessionnelle</b>															
Professions intermédiaires	15%	réf		73%	réf		51%	réf		83%	réf		41%	réf	
Agriculteurs	12%	0,8	0,4	1,8	0,7	0,4	1,1	1,2	0,7	2,0	0,6	0,3	1,1	1,1	0,7
Artisans, commerçant chef d'entreprise	15%	0,9	0,6	1,6	0,8	0,5	1,1	1,1	0,7	1,6	0,7	0,4	1,2	1,1	0,7
Cadres et professions intellectuelles	15%	1,1	0,7	1,7	0,9	0,7	1,3	1,0	0,7	1,4	0,7	0,5	1,0	1,2	0,9
Employés	21%	1,1	0,8	1,7	1,1	0,8	1,5	1,4**	1,0	1,9	1,4	0,9	2,0	1,3	1,0
Ouvriers	19%	1,4	0,9	2,1	1,0	0,7	1,5	1,3	0,9	1,9	1,0	0,7	1,6	1,4	1,0
Autres personnes sans activité professionnelle	32%	3,7	0,5	29,2	0,6	0,1	2,9	0,4	0,1	2,4	1,0	0,2	6,9	0,2	0,0
<b>Déjà été piqué par une tique</b>															
Non	16%	réf		70%	réf		40%	réf		78%	réf		32%	réf	
Oui	20%	1,4**	1,1	1,8	1,6***	1,3	2,0	3,7***	3,0	4,6	2,5***	1,8	3,3	3,2***	2,6
<b>Se sentir inquiet de contracter la BL</b>															
Non	12%	réf		68%	réf		40%	réf		77%	réf		32%	réf	
Oui	22%	2,1***	1,6	2,8	1,5***	1,2	1,9	2,4***	1,9	3,0	2,0***	1,5	2,6	2,2***	1,7
<b>Penser que les piqûres de tiques ont des conséquences sur la santé</b>															
Non	34%			52%	réf			réf			réf			réf	
Oui	17%			74%	2,4	0,9	6,5								
<b>Se sentir bien informé sur la BL</b>															
Non	17%			69%	réf			réf			réf			réf	
Oui	18%			78%	1,4**	1,1	1,7	1,7***	1,3	2,1	1,6***	1,2	2,1	1,5***	1,2

\*\*\* p<0.001 ; \*\* p<0.01 ; \* p<0.05. aOR: odds ratio ajusté ; IC95% : intervalle de confiance à 95%. § Utilisation de répulsif, porter des vêtements longs et s'inspecter le corps et retirer les tiques après exposition ; réf : catégorie de référence utilisée dans le modèle.