

SURVEILLANCE DU SIDA EN FRANCE

(Situation au 31 mars 1995) – Réseau national de Santé publique

Au cours du premier trimestre 1995, 1 486 nouveaux cas de SIDA ont été notifiés au Réseau national de Santé publique, 1 506 avaient été notifiés au cours du premier trimestre 1994. Depuis 2 ans, le nombre de nouveaux cas notifiés par trimestre est stable.

Depuis le début de l'épidémie, 35 773 cas de SIDA (35 198 adultes et 575 enfants) ont été notifiés dont 60,6 % sont connus comme étant décédés. L'estimation* du nombre total de cas de SIDA diagnostiqués depuis le début de l'épidémie se situe entre 41 500 et 45 000.

Chez les femmes (N = 6 097), le nombre de cas a augmenté en moyenne de 18 % par an de 1991 à 1994. L'augmentation du nombre de cas est plus rapide chez les femmes contaminées par voie sexuelle (en moyenne + 24 % par an sur ces 4 années) que chez les femmes toxicomanes. Parmi les cas féminins diagnostiqués en 1994, 43 % ont été contaminées par voie hétérosexuelle.

Chez les hommes (N = 29 676), le nombre de cas a augmenté de 7 % par an en moyenne de 1991 à 1994. Le nombre de cas augmente rapidement chez les hommes hétérosexuels (+ 31 % en moyenne sur ces 4 années) alors qu'il se stabilise chez les homo-bisexuels et les toxicomanes.

* Compte tenu des cas qui ne sont pas déclarés, et du délai qui existe entre le diagnostic et la déclaration.

Le nombre de nouveaux cas de SIDA chez des adultes jeunes âgés de 20 à 29 ans diminue depuis 1991 (- 5 % par an en moyenne), alors que l'effectif de toutes les classes d'âge supérieures continue d'augmenter. Cette évolution est particulièrement nette pour le groupe des toxicomanes.

Avec près de 6 cas de SIDA pour 10 000 habitants notifiés entre le 1^{er} avril 1994 et le 31 mars 1995, Paris et la Guyane restent les départements les plus touchés par l'épidémie. Viennent ensuite la Guadeloupe et les Alpes-Maritimes (environ 3 cas pour 10 000) et les départements de la petite couronne de Paris (2 cas pour 10 000 habitants).

En 1994, les principales pathologies d'entrée dans le SIDA sont la **pneumocystose**, la maladie de **Kaposi**, la **toxoplasmose cérébrale**, et la **candidose œsophagienne**. La fréquence des deux premières et, plus récemment, celle de la toxoplasmose cérébrale continuent de diminuer, alors que celle de la candidose œsophagienne augmente depuis 1991.

Parmi les pathologies plus rares, on observe depuis 1989 une augmentation de la fréquence de l'**infection à mycobactérie atypique**, de l'**infection à CMV** et de la **leuco-encéphalite multifocale progressive (LEMP)**.

SOMMAIRE

- Tableau 1. – Cas de SIDA déclarés et diagnostiqués par année.
- Tableau 2. – Cas de SIDA décédés selon l'année du décès.
- Tableau 3. – Cas de SIDA par âge au diagnostic et sexe.
- Tableau 4. – Cas de SIDA par groupe de transmission, année de diagnostic et sexe.
- Tableau 5. – Cas de SIDA hétérosexuels selon le risque du partenaire ou l'origine géographique du cas, par année de diagnostic.
- Tableau 6. – Cas de SIDA par groupe de transmission et région de domicile.
- Tableau 7. – Nombre et taux de cas de SIDA par million d'habitants par région et département de domicile.
- Tableau 8. – Cas de SIDA pédiatriques liés à une transmission materno-fœtale par année de diagnostic.
- Tableau 9. – Pathologies indicatives de SIDA par année de diagnostic chez les adultes.

- Figure 1. – Représentation régionale du taux annuel des cas de SIDA par million d'habitants.
- Figure 2. – Histogramme des cas de SIDA déclarés et redressés par semestre de diagnostic.
- Figure 3. – Évolution des cas de SIDA par classe d'âge et année de diagnostic.
- Figure 4. – Évolution du sexe ratio des cas de SIDA par groupe de transmission et année de diagnostic.
- Figure 5 a. – Évolution des cas de SIDA masculins selon le groupe de transmission par année de diagnostic.
- Figure 5 b. – Évolution des cas de SIDA féminins selon le groupe de transmission par année de diagnostic.
- Figure 6. – Représentation régionale des taux cumulés de cas de SIDA homo-bisexuels (a), toxicomanes (b), hétérosexuels (c), hémophiles/transfusés (d) par million d'habitants.
- Figure 7. – Évolution de la fréquence des pathologies indicatives de SIDA chez l'adulte.

Figure 1. – Taux des cas de SIDA déclarés du 1^{er} avril 1994 au 31 mars 1995 par million d'habitants (France, 31 mars 1995)




Figure 2. – Cas de SIDA déclarés en France au 31 mars 1995 et cas redressés en fonction des délais de déclaration, par semestre de diagnostic et pour le premier trimestre 1995




Tableau 1. – Nombre de cas de SIDA déclarés et diagnostiqués chaque année jusqu'au 31 mars 1995
(France, 31 mars 1995)

| | Avant 1987 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 1 ^{er} trim. | Total |
|---|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|----------------------------|----------------|
| Nombre de cas de SIDA déclarés . . . | 1 221 | 1 772 | 2 162 | 3 728 | 4 262 | 4 691 | 5 103 | 5 558 | 5 790 | 1 486 | 35 773 |
| Nombre de cas de SIDA diagnostiqués . . . | 2 214 | 2 244 | 3 045 | 3 784 | 4 286 | 4 585 | 5 033 | 5 349* | 5 776* | 1 539* | 37 855* |

* Cas redressés par rapport au délai de déclaration.

Tableau 2. – Nombre de cas de SIDA décédés selon l'année de décès
Nombre de cas de SIDA vivants au 31 décembre de chaque année et au 31 mars 1995
(France, 31 mars 1995)

| | Année | | | | | | | | | | | | Date de décès inconnue | Total | |
|--|--------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|---------------------------|---------------|
| | < 1984 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993* | 1994* | 1995* 1 ^{er} trim. | | |
| Décédés par année de décès . . . | 50 | 99 | 242 | 551 | 845 | 1 187 | 1 847 | 2 410 | 3 021 | 3 393 | 3 637 | 3 816 | 500 | 71 | |
| Décès cumulés à la fin de chaque période . . . | 50 | 149 | 391 | 942 | 1 787 | 2 974 | 4 821 | 7 231 | 10 252 | 13 645 | 17 282 | 21 098 | 21 598 | | 21 669 |
| Vivants cumulés à la fin de chaque période . . . | 91 | 229 | 569 | 1 272 | 2 671 | 4 529 | 6 466 | 8 342 | 9 906 | 11 546 | 13 145 | 14 196 | 14 104 | Taux de létalité = 60,6 % | |

* Données provisoires.

Figure 3. – Évolution du nombre de cas de SIDA par année de diagnostic selon la classe d'âge (pour les plus de 19 ans)
(France, 31 mars 1995, données redressées)




Figure 4. – Évolution du sexe ratio (H/F) des cas de SIDA par année de diagnostic et selon le groupe de transmission (France, 31 mars 1995, données redressées)




Tableau 3. – Répartition des cas de SIDA par âge au diagnostic et sexe
Cas diagnostiqués entre le 1^{er} avril 1993 et le 31 mars 1994, entre le 1^{er} avril 1994 et le 31 mars 1995 et depuis 1978
(France, 31 mars 1995)

| | Cas diagnostiqués* entre le 1 ^{er} avril 1993 et le 31 mars 1994 | | | Cas diagnostiqués* entre le 1 ^{er} avril 1994 et le 31 mars 1995 | | | Cas cumulés depuis 1978 | | |
|--------------------|---|--------------|----------------------|---|--------------|----------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| | Femmes | Hommes | Total (%) | Femmes | Hommes | Total (%) | Femmes | Hommes | Total (%) |
| | | | | | | | | | |
| < 5 ans . . . | 15 | 16 | 31 (0,6) | 4 | 11 | 15 (0,4) | 187 | 242 | 429 (1,2) |
| 5-14 ans . . . | 7 | 8 | 15 (0,3) | 4 | 3 | 7 (0,2) | 48 | 98 | 146 (0,4) |
| 15-19 ans . . . | 2 | 12 | 14 (0,3) | 6 | 3 | 9 (0,2) | 39 | 105 | 144 (0,4) |
| 20-24 ans . . . | 33 | 97 | 130 (2,4) | 31 | 63 | 94 (2,4) | 468 | 1 167 | 1 635 (4,6) |
| 25-29 ans . . . | 261 | 679 | 940 (17,7) | 167 | 399 | 566 (14,3) | 1 584 | 5 501 | 7 085 (19,8) |
| 30-34 ans . . . | 332 | 1 163 | 1 495 (28,1) | 242 | 844 | 1 086 (27,5) | 1 537 | 7 311 | 8 848 (24,7) |
| 35-39 ans . . . | 170 | 849 | 1 019 (19,1) | 155 | 649 | 804 (20,4) | 794 | 5 421 | 6 215 (17,4) |
| 40-44 ans . . . | 91 | 577 | 668 (12,5) | 77 | 439 | 516 (13,1) | 441 | 3 837 | 4 278 (12,0) |
| 45-49 ans . . . | 52 | 354 | 406 (7,6) | 44 | 322 | 366 (9,3) | 227 | 2 306 | 2 533 (7,1) |
| 50-59 ans . . . | 45 | 338 | 383 (7,2) | 55 | 270 | 325 (8,2) | 333 | 2 437 | 2 770 (7,7) |
| 60-69 ans . . . | 29 | 140 | 169 (3,2) | 33 | 94 | 127 (3,2) | 283 | 944 | 1 227 (3,4) |
| > 70 ans . . . | 10 | 43 | 53 (1,0) | 7 | 24 | 31 (0,8) | 156 | 307 | 463 (1,3) |
| Total . . . | 1 047 | 4 276 | 5 323 (100,0) | 825 | 3 121 | 3 946 (100,0) | 6 097 | 29 676 | 35 773 (100,0) |
| | SR = 4,1 | | | SR = 3,8 | | | SR = 4,9 | | |

* Données provisoires

Tableau 4. – Répartition des cas de SIDA par groupe de transmission, année de diagnostic et sexe (France, 31 mars 1995)

| Groupe de transmission | Année de diagnostic | | | | | | | | | Cas cumulés depuis 1978 | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|------------------|---------------------------|
| | < 1987 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993* | 1994* | 1995* 1 ^{er} trim. | Femmes | Hommes | Total |
| 1. Homo-bisexuel masculin | 1 364 (61,6) | 1 251 (55,7) | 1 577 (51,8) | 1 847 (48,8) | 2 086 (48,7) | 2 143 (46,7) | 2 253 (44,8) | 2 099 (40,1) | 1 944 (39,9) | 176 (36,7) | – | 16 740 (46,8) | 16 740 (46,8) |
| 2. Toxicomane | 206 (9,3) | 340 (15,2) | 634 (20,8) | 894 (23,6) | 1 070 (25,0) | 1 202 (26,2) | 1 297 (25,8) | 1 415 (27,0) | 1 212 (24,9) | 133 (27,8) | 2 206 | 6 197 (23,5) | 8 403 (23,5) |
| 3. (1) et (2) | 70 (3,2) | 56 (2,5) | 44 (1,4) | 76 (2,0) | 52 (1,2) | 58 (1,3) | 53 (1,1) | 41 (0,8) | 40 (0,8) | 7 (1,5) | – | 497 (1,4) | 497 (1,4) |
| 4. Hémophile et trouble de la coagulation (a) | 31 (1,4) | 32 (1,4) | 50 (1,6) | 73 (1,9) | 41 (1,0) | 63 (1,4) | 59 (1,2) | 58 (1,1) | 58 (1,2) | 2 (0,4) | 12 | 455 (1,3) | 467 (1,3) |
| 5. Contamination hétérosexuelle | 285 (12,9) | 220 (9,8) | 345 (11,3) | 428 (11,4) | 489 (11,4) | 564 (12,3) | 672 (13,4) | 813 (15,5) | 884 (18,2) | 95 (19,8) | 2 311 | 2 484 (13,4) | 4 795 (13,4) |
| 6. Transfusé (b) | 139 (6,3) | 185 (8,2) | 213 (7,0) | 222 (5,9) | 190 (4,4) | 164 (3,6) | 178 (3,5) | 158 (3,0) | 109 (2,2) | 12 (2,5) | 738 | 832 (4,4) | 1 570 (4,4) |
| 7. Transmission materno-fœtale | 44 (2,0) | 67 (3,0) | 52 (1,7) | 56 (1,5) | 58 (1,4) | 53 (1,2) | 42 (0,8) | 41 (0,8) | 31 (0,6) | 0 (0,0) | 198 | 246 (1,2) | 444 (1,2) |
| 8. Autre, inconnu (c) | 75 (3,4) | 93 (4,1) | 130 (4,3) | 188 (5,0) | 300 (7,0) | 338 (7,4) | 479 (9,5) | 611 (11,7) | 589 (12,1) | 54 (11,3) | 632 | 2 225 (8,0) | 2 857 (8,0) |
| donc : multipartenariat et/ou fréquentation de prostituées | 9 | 34 | 50 | 77 | 123 | 111 | 135 | 147 | 142 | 8 | 107 | 729 | 836 |
| Total | 2 214 (100,0) | 2 244 (100,0) | 3 045 (100,0) | 3 784 (100,0) | 4 286 (100,0) | 4 585 (100,0) | 5 033 (100,0) | 5 236 (100,0) | 4 867 (100,0) | 479 (100,0) | 6 097 | 29 676 | 35 773 (100,0) |

* Données provisoires

(a) Sont inclus 43 cas pédiatriques

(b) Sont inclus 80 cas pédiatriques

(c) Sont inclus 8 cas pédiatriques, 12 cas de contamination professionnelle chez des personnels de santé dont 11 présumés et 1 prouvé.

Figure 5 a. – Évolution du nombre de cas de SIDA féminins par année de diagnostic selon les principaux groupes de transmission (France, 31 mars 1995, données redressées)




Figure 5 b. – Évolution du nombre de cas de SIDA masculins par année de diagnostic selon les principaux groupes de transmission (France, 31 mars 1995, données redressées)




Tableau 5. – Répartition des cas de SIDA contaminés lors de rapports hétérosexuels selon soit le risque du partenaire, soit l'origine géographique du cas par année de diagnostic (France, 31 mars 1995)

| Risque du partenaire ou origine géographique du cas | Année de diagnostic | | | | | | | | | Total | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | < 1987 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993* | 1994* | | |
| Partenaire bisexuel masculin | 6 (2,1) | 6 (2,7) | 14 (4,1) | 19 (4,4) | 21 (4,3) | 20 (3,5) | 16 (2,4) | 15 (1,8) | 20 (2,3) | 3 (3,2) | 140 (2,9) |
| Partenaire toxicomane | 11 (3,9) | 18 (8,2) | 34 (9,9) | 64 (15,0) | 81 (16,6) | 109 (19,3) | 131 (19,5) | 179 (22,0) | 161 (18,2) | 21 (22,1) | 809 (16,9) |
| Partenaire hémophile | 1 (0,4) | 1 (0,5) | 3 (0,9) | 1 (0,2) | 2 (0,4) | 0 (0,0) | 6 (0,9) | 5 (0,6) | 5 (0,6) | 0 (0,0) | 24 (0,5) |
| Partenaire transfusé | 1 (0,4) | 5 (2,3) | 11 (3,2) | 14 (3,3) | 13 (2,7) | 13 (2,3) | 17 (2,5) | 17 (2,1) | 20 (2,3) | 4 (4,2) | 115 (2,4) |
| Partenaire séropositif (sans autre précision) | 2 (0,7) | 13 (5,9) | 36 (10,4) | 38 (8,9) | 52 (7,4) | 80 (9,2) | 125 (11,9) | 134 (15,4) | 17 (15,2) | 533 (11,1) | 533 (11,1) |
| Partenaire originaire des Caraïbes | 9 (3,2) | 7 (3,2) | 9 (2,6) | 16 (3,7) | 10 (2,0) | 20 (3,5) | 22 (3,3) | 30 (3,7) | 37 (4,2) | 5 (5,3) | 165 (3,4) |
| Partenaire originaire d'Afrique | 44 (15,4) | 34 (15,5) | 72 (20,9) | 65 (15,2) | 69 (14,1) | 56 (9,9) | 68 (10,1) | 97 (11,9) | 87 (9,8) | 6 (6,3) | 598 (12,5) |
| Patient originaire des Caraïbes | 112 (39,3) | 75 (34,1) | 94 (27,2) | 133 (31,1) | 130 (26,6) | 119 (21,1) | 142 (21,1) | 119 (14,6) | 165 (18,7) | 18 (18,9) | 1 107 (23,1) |
| Patient originaire d'Afrique | 99 (34,7) | 61 (27,7) | 72 (20,9) | 78 (18,2) | 127 (26,0) | 175 (31,0) | 190 (28,3) | 226 (27,8) | 255 (28,8) | 21 (22,1) | 1 304 (27,2) |
| Total | 285 (100,0) | 220 (100,0) | 345 (100,0) | 428 (100,0) | 489 (100,0) | 564 (100,0) | 672 (100,0) | 813 (100,0) | 884 (100,0) | 95 (100,0) | 4 795 (100,0) |

* Données provisoires.

Tableau 6. – Proportion des groupes de transmission, par région de domicile, des cas de SIDA diagnostiqués entre le 1^{er} avril 1994 et le 31 mars 1995* et des cas cumulés depuis 1978 (nombres entre parenthèses)
(France, 31 mars 1995)

| Régions | Homo-bisexual masculin | Toxicomane | (1) et (2) | Hémophile | Contamination hétérosexuelle | Transfusé | Transmission materno-fœtale | Autre, inconnu | Total | Effectif |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| Alsace | 51,4 (51,5) | 16,2 (21,1) | 0,0 (0,8) | 2,7 (2,3) | 13,5 (9,0) | 0,0 (3,7) | 0,0 (0,3) | 16,2 (11,3) | 100 (100) | 37 (355) |
| Aquitaine | 40,8 (38,1) | 29,9 (31,1) | 0,6 (1,5) | 1,1 (1,7) | 13,2 (8,5) | 3,4 (9,8) | 0,0 (0,9) | 10,9 (8,3) | 100 (100) | 174 (1 668) |
| Auvergne | 40,4 (49,8) | 27,7 (22,3) | 2,1 (0,7) | 0,0 (2,4) | 19,1 (7,7) | 2,1 (7,3) | 0,0 (2,1) | 8,5 (7,7) | 100 (100) | 47 (287) |
| Bourgogne | 45,6 (44,8) | 10,5 (22,1) | 1,8 (1,4) | 1,8 (1,7) | 21,1 (13,8) | 3,5 (5,5) | 1,8 (0,8) | 14,0 (9,9) | 100 (100) | 57 (362) |
| Bretagne | 44,0 (45,9) | 17,6 (19,4) | 1,1 (2,0) | 5,5 (3,0) | 11,0 (12,3) | 2,2 (5,9) | 1,1 (0,8) | 17,6 (10,7) | 100 (100) | 91 (608) |
| Centre | 31,0 (45,5) | 18,3 (17,6) | 0,0 (1,1) | 1,4 (2,9) | 26,8 (15,5) | 4,2 (6,8) | 1,4 (0,9) | 16,9 (9,8) | 100 (100) | 71 (561) |
| Champagne - Ardenne | 30,0 (36,9) | 17,5 (16,6) | 2,5 (2,3) | 2,5 (2,7) | 15,0 (12,6) | 2,5 (10,6) | 0,0 (1,0) | 30,0 (17,3) | 100 (100) | 40 (301) |
| Corse | 17,4 (19,0) | 60,9 (55,3) | 4,3 (4,5) | 0,0 (0,0) | 8,7 (7,3) | 0,0 (2,2) | 0,0 (3,4) | 8,7 (8,4) | 100 (100) | 23 (179) |
| Franche-Comté | 50,0 (49,7) | 26,9 (23,1) | 0,0 (1,0) | 0,0 (1,5) | 11,5 (11,3) | 0,0 (5,6) | 3,8 (2,1) | 7,7 (5,6) | 100 (100) | 26 (195) |
| Île-de-France | 42,8 (54,8) | 21,6 (19,6) | 0,9 (1,4) | 0,9 (0,8) | 20,0 (11,9) | 1,4 (3,2) | 0,6 (0,9) | 11,8 (7,4) | 100 (100) | 1 732 (16 860) |
| Languedoc - Roussillon | 47,3 (48,1) | 27,5 (26,4) | 0,8 (1,4) | 0,8 (1,9) | 8,4 (8,0) | 3,8 (3,7) | 0,0 (1,8) | 11,5 (8,7) | 100 (100) | 131 (1 180) |
| Limousin | 43,3 (47,3) | 26,7 (21,9) | 1,4 (0,5) | 3,3 (2,0) | 16,7 (7,5) | 3,3 (7,5) | 0,0 (3,0) | 6,7 (10,4) | 100 (100) | 30 (201) |
| Lorraine | 38,6 (49,3) | 13,6 (14,6) | 4,5 (2,0) | 4,5 (2,9) | 13,6 (11,0) | 2,3 (8,5) | 0,0 (1,2) | 22,7 (10,5) | 100 (100) | 44 (410) |
| Midi - Pyrénées | 45,9 (44,9) | 29,7 (29,1) | 1,8 (1,6) | 1,8 (2,1) | 7,2 (8,8) | 2,7 (4,0) | 0,0 (1,7) | 10,8 (7,8) | 100 (100) | 111 (1 165) |
| Nord - Pas-de-Calais | 45,7 (53,4) | 15,2 (15,3) | 0,0 (1,0) | 0,0 (1,8) | 30,4 (14,9) | 2,2 (4,6) | 0,0 (1,2) | 6,5 (7,7) | 100 (100) | 46 (496) |
| Basse-Normandie | 44,9 (38,3) | 20,4 (29,1) | 2,0 (1,1) | 6,1 (4,6) | 10,2 (10,6) | 6,1 (5,7) | 0,0 (1,4) | 10,2 (9,1) | 100 (100) | 49 (350) |
| Haute-Normandie | 37,8 (43,5) | 15,6 (14,6) | 0,0 (1,4) | 6,7 (4,3) | 22,2 (16,2) | 6,7 (8,6) | 2,2 (1,4) | 8,9 (10,1) | 100 (100) | 45 (444) |
| Pays de la Loire | 45,4 (46,7) | 19,6 (17,1) | 0,0 (1,5) | 1,0 (4,4) | 13,4 (11,7) | 6,2 (5,4) | 1,0 (1,4) | 13,4 (11,8) | 100 (100) | 97 (721) |
| Picardie | 47,5 (43,1) | 22,5 (16,8) | 0,0 (1,1) | 0,0 (1,7) | 15,0 (15,1) | 5,0 (10,9) | 0,0 (1,1) | 10,0 (10,1) | 100 (100) | 40 (357) |
| Poitou - Charentes | 36,8 (43,7) | 31,6 (21,5) | 1,8 (1,1) | 3,5 (1,6) | 15,8 (11,8) | 0,0 (10,2) | 0,0 (1,4) | 10,5 (8,8) | 100 (100) | 57 (442) |
| Provence - Alpes - Côte d'Azur | 31,5 (32,5) | 46,4 (44,8) | 0,7 (1,6) | 0,2 (0,9) | 11,2 (7,9) | 1,7 (4,8) | 0,4 (1,2) | 7,9 (6,3) | 100 (100) | 534 (4 756) |
| Rhône - Alpes | 43,6 (51,6) | 18,5 (21,6) | 0,4 (1,5) | 0,8 (1,5) | 14,4 (9,9) | 1,6 (2,3) | 0,0 (0,8) | 20,6 (10,8) | 100 (100) | 243 (1 770) |
| Antilles - Guyane | 14,8 (13,2) | 4,5 (4,5) | 0,0 (0,4) | 1,1 (0,4) | 72,7 (67,2) | 1,7 (2,4) | 1,1 (5,5) | 4,0 (6,4) | 100 (100) | 176 (1 354) |
| Réunion | 60,0 (37,5) | 0,0 (17,5) | 0,0 (0,0) | 0,0 (1,7) | 0,0 (21,7) | 40,0 (7,5) | 0,0 (3,3) | 0,0 (10,8) | 100 (100) | 5 (120) |
| Domicile à l'étranger ou inconnu | 32,5 (39,1) | 12,5 (13,6) | 0,0 (0,8) | 0,0 (0,5) | 35,0 (31,5) | 5,0 (5,7) | 0,0 (1,4) | 15,0 (7,3) | 100 (100) | 40 (631) |
| Total | 39,8 (46,8) | 24,5 (23,5) | 0,9 (1,4) | 1,2 (1,3) | 19,2 (13,4) | 2,1 (4,4) | 0,5 (1,2) | 11,8 (8,0) | 100 (100) | 3 946 (35 773) |

* Données provisoires

Figure 6 a. – Taux de cas de SIDA cumulés depuis 1978 chez les homo-bisexuels par million d'habitants
(France, 31 mars 1995)




Figure 6 b. – Taux de cas de SIDA cumulés depuis 1978 chez les toxicomanes par million d'habitants
(France, 31 mars 1995)





Tableau 7. – Nombre de cas de SIDA par département et région de domicile, déclarés entre le 1^{er} avril 1994 et le 31 mars 1995 et depuis 1978, et taux par million d'habitants (France, 31 mars 1995)

| Départements Régions | Cas de SIDA déclarés du 1/4/1994 au 31/3/1995 | | Cas de SIDA cumulés 1978-1995 | |
|-------------------------------|--|--------------|----------------------------------|----------------|
| | Nombre | Taux | Nombre | Taux |
| 67 | 20 | 21,0 | 230 | 241,3 |
| 68 | 29 | 43,2 | 125 | 186,3 |
| Alsace | 49 | 30,2 | 355 | 218,6 |
| 24 | 17 | 44,0 | 130 | 336,8 |
| 33 | 181 | 149,2 | 935 | 770,8 |
| 40 | 22 | 70,7 | 118 | 379,4 |
| 47 | 18 | 58,8 | 117 | 382,4 |
| 64 | 62 | 107,1 | 368 | 635,6 |
| Aquitaine | 300 | 107,3 | 1 668 | 596,8 |
| 3 | 12 | 33,5 | 65 | 181,6 |
| 15 | 4 | 25,2 | 21 | 132,1 |
| 43 | 7 | 33,8 | 27 | 130,4 |
| 63 | 35 | 58,5 | 174 | 291,0 |
| Auvergne | 58 | 43,9 | 287 | 217,1 |
| 21 | 27 | 54,7 | 134 | 271,3 |
| 58 | 12 | 51,5 | 49 | 210,3 |
| 71 | 15 | 26,8 | 86 | 153,8 |
| 89 | 18 | 55,7 | 93 | 287,9 |
| Bourgogne | 72 | 44,7 | 362 | 225,0 |
| 22 | 19 | 35,3 | 89 | 165,4 |
| 29 | 42 | 50,1 | 182 | 216,9 |
| 35 | 36 | 45,1 | 187 | 234,0 |
| 56 | 34 | 54,8 | 150 | 241,9 |
| Bretagne | 131 | 46,9 | 608 | 217,5 |
| 18 | 16 | 49,7 | 61 | 189,4 |
| 28 | 13 | 32,8 | 89 | 224,7 |
| 36 | 7 | 29,4 | 35 | 147,1 |
| 37 | 22 | 41,6 | 141 | 266,5 |
| 41 | 18 | 58,8 | 78 | 254,9 |
| 45 | 32 | 55,1 | 157 | 270,2 |
| Centre | 108 | 45,6 | 561 | 236,6 |
| 8 | 7 | 23,6 | 41 | 138,5 |
| 10 | 17 | 58,8 | 93 | 321,8 |
| 51 | 17 | 30,5 | 125 | 224,0 |
| 52 | 9 | 44,1 | 42 | 205,9 |
| Champagne - Ardenne | 50 | 37,1 | 301 | 223,3 |
| 2 A | 13 | 110,2 | 75 | 635,6 |
| 2 B | 17 | 128,8 | 104 | 787,9 |
| Corse | 30 | 120,0 | 179 | 716,0 |
| 25 | 21 | 43,3 | 110 | 226,8 |
| 39 | 4 | 16,1 | 25 | 100,4 |
| 70 | 7 | 30,4 | 29 | 126,1 |
| 90 | 2 | 14,9 | 31 | 231,3 |
| Franche-Comté | 34 | 31,0 | 195 | 177,8 |
| 75 | 1 195 | 555,3 | 8 677 | 4 032,1 |
| 77 | 117 | 108,5 | 610 | 565,9 |
| 78 | 153 | 117,1 | 768 | 587,6 |
| 91 | 122 | 112,4 | 723 | 666,4 |
| 92 | 298 | 214,1 | 1 868 | 1 342,0 |
| 93 | 325 | 235,3 | 1 914 | 1 386,0 |
| 94 | 266 | 218,8 | 1 508 | 1 240,1 |
| 95 | 130 | 123,8 | 792 | 754,3 |
| Île-de-France | 2 606 | 244,4 | 16 860 | 1 581,5 |
| 11 | 14 | 46,8 | 129 | 431,4 |
| 30 | 40 | 68,4 | 288 | 492,3 |
| 34 | 89 | 111,9 | 536 | 674,2 |
| 48 | 2 | 27,4 | 9 | 123,3 |
| 66 | 32 | 87,9 | 218 | 598,9 |
| Languedoc - Roussillon | 177 | 83,7 | 1 180 | 557,9 |
| 19 | 12 | 50,4 | 53 | 222,7 |
| 23 | 6 | 45,8 | 23 | 175,6 |
| 87 | 17 | 48,0 | 125 | 353,1 |
| Limousin | 35 | 48,4 | 201 | 278,0 |

Figure 6 c. – Taux de cas de SIDA cumulés depuis 1978 chez les hétérosexuels par million d'habitants
(France, 31 mars 1995)



| Départements Régions | Cas de SIDA déclarés du 1/4/1994 au 31/3/1995 | | Cas de SIDA cumulés 1978-1995 | |
|---------------------------------------|--|--------------|----------------------------------|----------------|
| | Nombre | Taux | Nombre | Taux |
| 54 | | 24 | 33,7 | 177 |
| 55 | | 3 | 15,3 | 26 |
| 57 | | 31 | 30,7 | 171 |
| 88 | | 7 | 18,1 | 36 |
| Lorraine | 65 | 28,2 | 410 | 93,3 |
| 9 | | 16 | 117,6 | 41 |
| 12 | | 8 | 29,6 | 44 |
| 31 | | 121 | 130,7 | 783 |
| 32 | | 5 | 28,6 | 41 |
| 46 | | 2 | 12,8 | 38 |
| 65 | | 7 | 31,1 | 65 |
| 81 | | 17 | 49,6 | 77 |
| 82 | | 8 | 40,0 | 76 |
| Midi - Pyrénées | 184 | 75,7 | 1 165 | 479,2 |
| 59 | | 61 | 24,1 | 384 |
| 62 | | 26 | 18,1 | 112 |
| Nord - P.-d.-Calais | 87 | 21,9 | 496 | 125,1 |
| 14 | | 39 | 63,1 | 232 |
| 50 | | 8 | 16,7 | 61 |
| 61 | | 13 | 44,4 | 57 |
| Basse-Normandie | 60 | 43,1 | 350 | 251,6 |
| 27 | | 19 | 37,0 | 126 |
| 76 | | 46 | 37,6 | 318 |
| Haute-Normandie | 65 | 37,4 | 444 | 255,6 |
| 44 | | 73 | 69,4 | 345 |
| 49 | | 25 | 35,4 | 165 |
| 53 | | 12 | 43,2 | 40 |
| 72 | | 24 | 46,7 | 105 |
| 85 | | 9 | 17,7 | 66 |
| Pays de la Loire | 143 | 46,7 | 721 | 235,7 |
| 2 | | 20 | 37,2 | 88 |
| 60 | | 29 | 39,9 | 207 |
| 80 | | 9 | 16,4 | 62 |
| Picardie | 58 | 32,0 | 357 | 197,1 |
| 86 | | 22 | 57,9 | 111 |
| Poitou - Charentes | 76 | 47,6 | 442 | 277,1 |
| 4 | | 15 | 114,5 | 70 |
| 5 | | 14 | 123,9 | 57 |
| 6 | | 271 | 278,8 | 1 988 |
| 13 | | 267 | 151,8 | 1 772 |
| 83 | | 93 | 114,1 | 538 |
| 84 | | 58 | 124,2 | 331 |
| Provence - Alpes - Côte d'Azur | 718 | 168,7 | 4 756 | 1 117,2 |
| 1 | | 17 | 36,1 | 84 |
| 7 | | 6 | 21,6 | 50 |
| 26 | | 20 | 48,3 | 101 |
| 38 | | 59 | 58,1 | 289 |
| 42 | | 24 | 32,2 | 137 |
| 69 | | 159 | 105,4 | 719 |
| 73 | | 17 | 48,9 | 92 |
| 74 | | 49 | 86,3 | 298 |
| Rhône - Alpes | 351 | 65,6 | 1 770 | 330,8 |
| 971 | | 136 | 351,4 | 581 |
| 972 | | 51 | 141,7 | 324 |
| 973 | | 68 | 591,3 | 449 |
| 974 | | 19 | 31,8 | 120 |
| D.O.M. | 274 | 187,7 | 1 474 | 1 009,6 |
| MÉTROPOLE ET D.O.M. | 5 731 | 98,9 | 35 142 | 606,2 |
| Domicile à l'étranger | 67 | | 601 | |
| Domicile inconnu | 0 | | 30 | |

Figure 6 d. – Taux de cas de SIDA cumulés depuis 1978 chez les hémophiles et transfusés par million d'habitants
(France, 31 mars 1995)





Tableau 8. – Répartition des cas de SIDA liés à une transmission materno-fœtale selon le mode de contamination de la mère par année de diagnostic (France, 31 mars 1995)

| Mode de contamination de la mère | Année de diagnostic | | | | | | | | | Total |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | < 1987 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993* | 1994* | |
| 1. Toxicomanie. % | 5 (11,4) | 35 (52,2) | 24 (46,2) | 23 (41,1) | 20 (34,5) | 16 (30,2) | 12 (28,6) | 13 (31,7) | 6 (19,4) | 0 (154 (34,7) |
| 2. Transfusion % | 1 (2,3) | 4 (6,0) | 0 (0,0) | 2 (3,6) | 1 (1,7) | 3 (5,7) | 2 (4,8) | 1 (2,4) | 1 (3,2) | 0 (15 (3,4) |
| 3. Contamination hétérosexuelle % | 36 (81,8) | 28 (41,8) | 26 (50,0) | 27 (48,2) | 36 (62,1) | 30 (56,6) | 23 (54,8) | 24 (58,5) | 22 (71,0) | 0 (252 (56,8) |
| 4. Inconnu. % | 2 (4,5) | 0 (0,0) | 2 (3,8) | 4 (7,1) | 1 (1,7) | 4 (7,5) | 5 (11,9) | 3 (7,3) | 2 (6,5) | 0 (23 (5,2) |
| Total. | 44 (100,0) | 67 (100,0) | 52 (100,0) | 56 (100,0) | 58 (100,0) | 53 (100,0) | 42 (100,0) | 41 (100,0) | 31 (100,0) | 0 (444 (100,0) |

* Données provisoires

Figure 7. – Fréquence* des pathologies indicatives de SIDA, par année de diagnostic, chez les adultes (France, 31 mars 1995)



* Fréquence par rapport à l'ensemble des pathologies d'entrée dans le Sida, isolées et associées, à l'exclusion des nouvelles pathologies de la définition de 1993.

** Atteintes neurologiques : cryptococcose cérébrale, LEMP, encéphalopathie à VIH.

*** Autres pathologies opportunistes : ensemble des pathologies non représentées sur une courbe spécifique.

Tableau 9. – Fréquence des pathologies opportunistes (1) chez les cas de SIDA adultes par année de diagnostic (France, 31 mars 1995)

| Critères de 1985 | <1987 n = 2 143 | 1987 n = 2 161 | 1988 n = 2 975 (n = 2 652) | 1989 n = 3 715 (n = 3 249) | 1990 n = 4 215 (n = 3 677) | 1991 n = 4 521 (n = 3 923) | 1992 n = 4 972 (n = 4 239) | 1993* n = 5 186 (n = 4 134) | 1994* n = 4 831 (n = 3 911) | 1995* n = 479 (n = 393) | Total n = 35 198 (n = 30 272) |
|---|--------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Pneumonie à <i>Pneumocystis carinii</i> . | 30,0 | 34,9 | 35,2 (39,4) | 33,8 (38,6) | 29,6 (33,9) | 28,3 (32,6) | 24,5 (28,8) | 21,3 (26,7) | 19,4 (24,0) | 24,4 (29,8) | 27,3 (31,7) |
| Kaposi | 30,5 | 23,0 | 19,7 (22,1) | 17,5 (20,0) | 18,2 (20,9) | 17,0 (19,6) | 15,7 (18,4) | 14,0 (17,5) | 13,4 (16,5) | 10,0 (12,2) | 17,4 (20,2) |
| Candidose de l'œsophage | 21,6 | 21,7 | 16,9 (19,0) | 14,8 (16,9) | 13,6 (15,6) | 12,7 (14,7) | 12,9 (15,1) | 13,8 (17,3) | 15,5 (19,2) | 18,6 (22,6) | 15,1 (17,6) |
| Toxoplasmose cérébrale | 10,6 | 10,5 | 11,4 (12,8) | 13,4 (15,3) | 15,8 (18,1) | 15,9 (18,3) | 16,0 (18,8) | 12,7 (15,9) | 11,5 (14,2) | 8,1 (9,9) | 13,4 (15,6) |
| Infection à C.M.V. | 7,8 | 5,6 | 4,8 (5,4) | 4,6 (5,3) | 5,1 (5,8) | 5,4 (6,2) | 6,3 (7,4) | 6,1 (7,6) | 7,5 (9,3) | 9,2 (11,2) | 5,9 (6,9) |
| Cryptosporidiose | 6,7 | 7,5 | 3,9 (4,4) | 3,6 (4,1) | 3,4 (3,9) | 3,6 (4,1) | 3,7 (4,3) | 4,6 (5,8) | 4,2 (5,2) | 3,1 (3,8) | 4,3 (5,0) |
| Lymphomes | 4,6 | 3,1 | 3,5 (3,9) | 3,5 (4,0) | 3,6 (4,1) | 3,8 (4,4) | 4,9 (5,7) | 4,3 (5,4) | 4,6 (5,7) | 4,4 (5,3) | 4,1 (4,7) |
| Infection à H.S.V. | 7,5 | 4,9 | 2,1 (2,4) | 1,5 (1,7) | 1,8 (2,0) | 1,6 (2,1) | 1,6 (1,9) | 1,9 (2,4) | 2,4 (3,0) | 1,0 (1,3) | 2,4 (2,8) |
| Cryptococcose extra-pulmonaire . | 3,1 | 2,5 | 1,4 (1,6) | 1,9 (2,2) | 2,2 (2,5) | 2,5 (2,9) | 2,5 (2,2) | 1,7 (2,2) | 2,3 (2,9) | 2,5 (3,1) | 2,2 (2,6) |
| Infection à mycobactéries atypique | 1,5 | 1,7 | 0,8 (0,9) | 1,1 (1,2) | 1,5 (1,7) | 2,2 (2,5) | 2,9 (3,4) | 4,4 (5,5) | 4,3 (5,3) | 3,3 (4,1) | 2,5 (2,9) |
| L.E.M.P. | 0,7 | 0,8 | 0,5 (0,6) | 0,5 (0,6) | 1,0 (1,1) | 1,4 (1,6) | 1,6 (1,9) | 2,5 (3,2) | 2,9 (3,5) | 2,9 (3,6) | 1,5 (1,8) |
| Critères de 1987 | 1988 n = 2 975 | 1989 n = 3 715 | 1990 n = 4 215 | 1991 n = 4 521 | 1992 n = 4 972 | 1993* n = 5 186 [n = 4 833] | 1994* n = 4 831 [n = 4 512] | 1995* n = 479 [n = 446] | Total 30 894 [n = 30 189] | | |
| Encéphalopathie due au V.I.H. | 5,8 | 6,4 | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 5,3 [5,7] | 5,1 [5,5] | 4,8 [5,2] | 5,5 [5,7] | 5,6 [5,7] | |
| Infection à <i>Mycobacterium tuberculosis</i> extra-pulmonaire | 5,2 | 5,9 | 6,0 | 5,7 | 5,9 | 5,3 [5,7] | 5,1 [5,5] | 5,8 [6,3] | 5,6 [5,7] | 5,6 [5,7] | |
| Syndrome cachectique | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 4,1 | 5,4 | 4,5 [4,9] | 3,7 [3,9] | 2,1 [2,2] | 3,9 [4,0] | 3,9 [4,0] | |
| Critères de 1993 | | | | | | 1993* n = 5 186 | 1994* n = 4 831 | 1995* n = 479 | Total 10 496 n = 10 189 | | |
| Tuberculose pulmonaire | | | | | | 6,1 | 6,5 | 6,3 | 6,3 | | |

* Données provisoires

n Nombre total de cas diagnostiqués. (n) Nombre de cas diagnostiqués selon la définition de 1985. [n] Nombre de cas diagnostiqués selon la définition de 1987.

(1) Pathologies dont la fréquence est supérieure à 1%

ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE ET DESCRIPTION DE LA NOTIFICATION AU RÉSEAU NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE (R.N.S.P.).

Le système de surveillance du SIDA, mis en place en 1982, repose sur la déclaration obligatoire faite par les praticiens (décret du 10 juin 1986). La déclaration est basée sur la définition O.M.S./C.D.C. du SIDA, révisée en 1993 (B.E.H. n° 51/1987 et 11/1993).

Le décès d'un cas de SIDA, en vertu de l'article L. 12 du code de la Santé publique, est à déclaration obligatoire.

La surveillance est coordonnée au niveau du département par le médecin inspecteur de la Santé publique et au niveau national par le R.N.S.P.

La situation du SIDA en France est publiée chaque trimestre dans le *B.E.H.* Des documents régionaux contenant des tableaux détaillés par département et hôpital ayant déclaré plus de 20 cas sur les 4 derniers semestres, sont publiés chaque semestre et sont disponibles auprès des médecins inspecteurs des D.D.A.S.S.

La distribution des délais de déclaration (délai entre le diagnostic du SIDA et l'enregistrement au R.N.S.P.) pour les 1 486 cas enregistrés au cours du 1^{er} trimestre 1995 est la suivante : 32 % ont été déclarés durant le trimestre de diagnostic, 37 % ont été déclarés avec 1 trimestre de retard, 16 % avec 2 ou 3 trimestres de retard et 15 % un an ou plus après le diagnostic.

Au cours de ce trimestre, 8,6 % des questionnaires reçus concernaient des cas déjà déclarés et 3 % ne correspondaient pas aux critères actuels de la définition du SIDA, 11,6 % des déclarations reçues n'ont donc pas été retenues.

PRÉSENTATION DES DONNÉES

Les délais de déclaration : Les cas sont déclarés avec un certain délai dont on tient compte en corigeant (ou « redressant ») les données des années récentes. Ceci est réalisé à l'aide d'un modèle mathématique [1], qui utilise la distribution des délais de déclaration des cas déjà déclarés. Les redressements sont effectués sur 8 trimestres de déclaration et portent par conséquent sur les données des années 1993 (à partir du 2^e trimestre), 1994 et 1995.

Le redressement des données par rapport aux délais de déclaration a permis d'estimer à 37 855 (35 773 + 2 082) le nombre de cas cumulés au 31 mars 1995 (fig. 2).

L'analyse des tendances (en effectifs) n'est possible qu'à partir de données redressées. Plusieurs figures permettent d'interpréter des tendances au cours du temps : l'évolution du nombre de nouveaux cas selon la classe d'âge (fig. 3), l'évolution du sexe ratio (fig. 4), l'évolution du nombre de nouveaux cas par groupe de transmission (fig. 5 a et 5 b), l'évolution de la fréquence des pathologies opportunistes (fig. 7).

Les décès des cas de SIDA sont sous-déclarés, le taux de létalité de 60,6 % (nombre de cas décédés/nombre total de cas) est donc sous-estimé.

L'âge regroupé en classes de 5 ou 10 ans, représente l'âge au moment du diagnostic du SIDA. La distinction adulte/cas pédiatrique est basée sur l'âge au diagnostic du SIDA, les sujets considérés comme adultes ont 15 ans ou plus au moment du diagnostic.

Les cas pédiatriques sont affectés d'une sous-déclaration beaucoup plus importante que les cas adultes et l'interprétation des données doit être faite avec prudence.

Les catégories d'exposition au risque, ou groupes de transmission, sont hiérarchisées de 1 à 6. Chaque cas est classé dans un seul groupe. Les sujets présentant plusieurs risques sont classés dans le groupe de transmission listé le premier dans la hiérarchie, sauf pour les sujets à la fois homosexuels et toxicomanes pour lesquels il existe un groupe spécifique.

La catégorie 5 « Contamination hétérosexuelle » rassemble les sujets ayant un partenaire sexuel à risque, qu'il soit bisexuel, toxicomane, hémophile, transfusé, originaire d'Afrique sub-saharienne ou des Caraïbes, les sujets ayant un partenaire séropositif sans autre précision et les sujets originaires d'Afrique sub-saharienne ou des Caraïbes (y compris des Antilles françaises et de la Guyane).

La catégorie 7 « Transmission materno-fœtale » regroupe les enfants nés de mère séropositive.

La catégorie 8 « Autres, inconnu » rassemble des sujets pour lesquels le mode de contamination ne peut être connu (décédé ou perdu de vue), des sujets pour lesquels aucune situation à risque décrite dans les catégories 1 à 6 n'a pu être évoquée, des sujets dont le mode de contamination est en cours d'investigation et des personnels de santé contaminés dans l'exercice de leur profession.

Les cas pour lesquels la notion de fréquentation de prostitué(e)s et/ou de multipartenariat est connue, sont détaillés dans le tableau 4 (voir *B.E.H.* n° 6/1993).

Le regroupement des cas par département ou région est fait selon le domicile du patient et non selon le lieu de prise en charge médicale.

Les effectifs par région des tableaux 6 et 7 diffèrent, le tableau 6 est réalisé à partir des cas **diagnostiqués** sur les 12 derniers mois, alors que le tableau 7 est réalisé à partir des cas **déclarés** sur les 12 derniers mois.

Les taux de cas de SIDA par million d'habitants sont établis à partir des données de population issues du recensement de 1990 ; les taux annuels font référence à l'année de recueil et non à l'année de diagnostic.

La première pathologie opportuniste indicative de SIDA et celles diagnostiquées éventuellement dans un délai de 1 mois sont prises en compte. Les pathologies observées ne représentent que le mode d'entrée dans le SIDA, les patients pouvant présenter d'autres pathologies au cours de la maladie.

La fréquence annuelle de chaque pathologie est calculée par rapport à 2 dénominateurs différents (tab. 9). D'une part, chaque pathologie est rapportée à l'ensemble des cas diagnostiqués dans l'année, selon la définition en cours. D'autre part, afin d'analyser les tendances, les pathologies correspondant aux anciens critères (définition 1985, définition 1987) sont rapportées au nombre de cas diagnostiqués dans l'année selon ces mêmes critères (chiffres entre parenthèses ou entre crochets).

Les patients pouvant présenter plusieurs pathologies opportunistes, la somme des fréquences par année de diagnostic est supérieure à 100 %.

Depuis la révision de la définition en janvier 1993, 662 tuberculoses pulmonaires, 216 pneumopathies bactériennes récurrentes et 53 cancers invasifs du col ont été rapportés.

[1] HEISTERKAMP (S.H.), JAGER (J.-C.), RUITENBERG (E.-J.), VAN DRUNEN (J.A.M.), DOWNS (A.-M.). – **Correcting reported AIDS incidence : a statistical approach.** – *Stat. Med.* 1989, 8 : 963-76.

Cas déclarés pour certaines maladies transmissibles

Données provisoires non validées

Sémaine du 15 au 21 mai 1995

| RÉGIONS | DÉPARTEMENTS | POPULATION EN 1990 | Typho/Paratypho. | SIDA | Meningite à méningocoques | Brucellose | Tétanos | Tuberculose | T.I.A.C. | Boutisme | Légonellose | Poliomyélite | RÉGIONS | DÉPARTEMENTS | POPULATION EN 1990 | Typho/Paratypho. | SIDA | Meningite à méningocoques | Brucellose | Tétanos | Tuberculose | T.I.A.C. | Boutisme | Légonellose | Poliomyélite | |
|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|--------|---------------------------|------------|---------|-------------|----------|----------|-------------|--------------|---|-------------------------------|--------------------|------------------|--------|---------------------------|------------|---------|-------------|----------|----------|-------------|--------------|--------|
| ALSACE | 67 Rhin (Bas-) | 953 053 | | 3 | | | | | | | | | LIMOUSIN | 19 Corrèze | 237 908 | | | | | | | | | | | |
| | 68 Rhin (Haut-) | 671 319 | ////// | ////// | Non reçu | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// | | 23 Creuse | 131 349 | | | | | | | | | | | 1 |
| | Total | 1 624 372 | | 3 | | | | | | | | | | 87 Vienne (Haute-) | 353 593 | ////// | ////// | Non reçu | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// | 1 |
| AQUITAINE | 24 Dordogne | 386 365 | | | | | | | 1 | | | | LORRAINE | Total | 722 850 | | | | | | | | | | | |
| | 33 Gironde | 1 213 499 | 2 | 4 | | | | | | | | | | 54 Meurthe-et-Mos. | 711 822 | ////// | ////// | Non reçu | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// |
| | 40 Landes | 311 461 | ////// | ////// | Non reçu | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// | | 55 Meuse | 196 344 | | | | | | | | | | | |
| | 47 Lot-et-Garonne | 305 989 | ////// | ////// | Non reçu | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// | | 57 Moselle | 1 011 302 | | 1 | | | | | | | | | 3 |
| | 64 Pyrénées-Atlant. | 578 516 | | 2 | | | | | 3 | | | | | 88 Vosges | 386 258 | | | | | | | | | | | |
| | Total | 2 795 830 | 2 | 6 | | | | | 3 | 1 | | | | Total | 2 305 726 | | 1 | | | | | | | | | 3 |
| AUVERGNE | 03 Allier | 357 710 | | | | | | | | | | | MIDI-PYRÉNÉES | 09 Ariège | 136 455 | | 2 | 1 | | | | | | | | |
| | 15 Cantal | 158 723 | ////// | ////// | Non reçu | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// | | 12 Aveyron | 270 141 | | | | | | | | | | | |
| | 43 Loire (Haute-) | 206 568 | ////// | ////// | Non reçu | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// | | 31 Gironde (Hte-) | 925 962 | | | | | | | | | | | |
| | 63 Puy-de-Dôme | 598 213 | | 1 | | | | | | | | | | 32 Gers | 174 587 | | | | | | | | | | | |
| BOURGOGNE | Total | 1 321 214 | | 1 | | | | | | | | | NORD-PAS-DE-CALAIS | 46 Lot | 155 816 | | 2 | | | | | | | | | |
| | 21 Côte-d'Or | 493 866 | ////// | ////// | Non reçu | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// | | 65 Pyrénées (Htes-) | 224 759 | ////// | ////// | Non reçu | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// | |
| | 58 Nièvre | 233 278 | | | | | | | | | | | | 81 Tarn | 342 723 | | | | | | | | | | | |
| | 71 Saône-et-Loire | 559 413 | | | | | | | 1 | | | | | 82 Tarn-et-Gar. | 200 220 | | | | | | | | | | | |
| BRETAGNE | 89 Yonne | 323 096 | | | | | | | 1 | | | | NORMANDIE (BASSE-) | Total | 2 430 663 | | 4 | 1 | | | | | | | | |
| | Total | 1 609 653 | | | | | | | 2 | | | | | 59 Nord | 2 531 855 | | | | | | | | | | | |
| | 22 Côtes-d'Armor | 538 395 | | | | | | | | 1 | | | | 62 Pas-de-Calais | 1 433 203 | | | | | | | | | | | |
| | 29 Finistère | 838 687 | | 5 | 1 | | | | 11 | | | | | Total | 3 955 058 | | | | | | | | | | | |
| CENTRE | 35 Ille-et-Vilaine | 798 718 | | | | | | | | 7 | | | NORMANDIE (HAUTE-) | 14 Calvados | 618 478 | | | | | | | | | | | 5 |
| | 56 Morbihan | 619 838 | | 2 | | | | | | 5 | | | | 50 Manche | 479 636 | | | | | | | | | | | 1 |
| | Total | 2 795 638 | | 7 | 1 | | | | 24 | | | | | 61 Orne | 293 204 | | | | | | | | | | | |
| | 18 Cher | 321 559 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | Total | 1 391 318 | | | | | | | | | | | 6 |
| CHAMPAGNE-ARDENNES | 28 Eure-et-Loir | 396 073 | ////// | ////// | Non reçu | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// | PAYS DE LA LOIRE | 27 Eure | 513 818 | | | | | | | | | | | 3 |
| | 36 Indre | 237 510 | | | | | | | 1 | | | | | 76 Seine-Maritime | 1 223 429 | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| | 37 Indre-et-Loire | 529 345 | ////// | ////// | Non reçu | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// | | Total | 1 737 247 | | 1 | | | | | | | | | 2 |
| | 41 Loir-et-Cher | 305 937 | | 1 | | | | | | | | | | 44 Loire-Atlant. | 1 052 183 | | 3 | | | | | | | | | 3 |
| CORSE | 45 Loiret | 580 612 | | 2 | | | | | | | | | PICARDIE | 49 Maine-et-Loire | 705 882 | | | | | | | | | | | 1 |
| | Total | 2 371 036 | | 3 | 1 | 1 | | | 2 | | | | | 53 Mayenne | 278 037 | | | | | | | | | | | 1 |
| | 08 Ardennes | 296 357 | | | | | | | 1 | 1 | | | | 72 Sarthe | 513 654 | | | | | | | | | | | |
| | 10 Aube | 289 207 | ////// | ////// | Non reçu | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// | | 85 Vendée | 509 356 | | 3 | 1 | | | | | | | | 1 |
| FRANCHE-COMTÉ | 51 Marne | 558 217 | | | | 1 | | | | | | | POITOU-CHARENTES | Total | 3 059 112 | | 6 | 1 | | | | | | | | 5 |
| | 52 Marne (Haute-) | 204 067 | 1 | | | | | | 2 | | | | | 02 Aisne | 537 259 | | | | | | | | | | | |
| | Total | 1 347 848 | 1 | | 1 | | | | 3 | | | | | 60 Oise | 725 603 | | 2 | | | | | | | | | 2 |
| | 2 A Corse-du-Sud | 118 174 | | 2 | | | | | | | | | | 80 Somme | 547 825 | | | | | | | | | | | 4 |
| ÎLE-DE-FRANCE | 2 B Corse (Haute-) | 131 563 | ////// | ////// | Non reçu | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | Total | 1 810 687 | | 2 | | | | | | | | | 6 |
| | Total | 249 737 | | 2 | | | | | | | | | | 16 Charente | 341 993 | | | | | | | | | | | 2 |
| | 25 Doubs | 484 770 | | 1 | | | | | 4 | | | | | 17 Charente-Mar. | 527 146 | | | | | | | | | | | |
| | 39 Jura | 248 759 | | | | | | | | | | | | 79 Sèvres (Deux-) | 345 965 | | | | | | | | | | | 4 |
| LANGUEDOC-ROUSSILLON | 70 Saône (Haute-) | 229 650 | | | | | | | | | | | RHÔNE-ALPES | 86 Vienne | 379 977 | | 1 | | | | | | | | | |
| | 90 Terr. de Belfort | 134 097 | | | | | | | | | | | | Total | 1 595 081 | | 3 | | | | | | | | | 6 |
| | Total | 1 097 276 | | 1 | | | | | 4 | | | | | 04 Alpes-Hte-Prov. | 130 883 | | | | | | | | | | | |
| | 75 Paris (Ville) | 2 152 423 | ////// | ////// | Non reçu | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// | | 05 Alpes (Hautes-) | 113 300 | ////// | ////// | Non reçu | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// | |
| FRANCE OUTRE-MER | 77 Seine-et-Marne | 1 078 166 | 2 | 5 | 1 | | | | 14 | 1 | | | FRANCE MÉTROPOLITAINE | 06 Alpes-Marit. | 971 829 | ////// | ////// | Non reçu | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// | |
| | 78 Yvelines | 1 307 150 | ////// | ////// | Non reçu | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// | | 13 B.-du-Rhône | 1 759 371 | | 9 | 1 | | | | | | | | 1 |
| | 91 Essonne | 1 084 824 | | 6 | | | | | | 7 | | | | 83 Var | 815 449 | | 7 | | | | | | | | | 1 |
| | 92 Hauts-de-Seine | 1 391 658 | | 11 | 1 | | | | 20 | | | | | 84 Vaucluse | 467 075 | | | | | | | | | | | 1 |
| FRANCE OUTRE-MER | 93 Seine-St-Denis | 1 381 197 | | 16 | | | | | 13 | | | | TOTAL DE LA SEMAINE FRANCE MÉTROPOLITAINE | Total | 4 257 907 | | 17 | 1 | | | | | | | | 2 |
| | 94 Val-de-Marne | 1 215 538 | | | | | | | 18 | | | | | 01 Ain | 471 019 | ////// | ////// | Non reçu | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// | |
| | 95 Val-d'Oise | 1 049 598 | | 13 | | | | | 17 | | | | | 07 Ardèche | 277 581 | ////// | ////// | Non reçu | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// | |
| | Total | 10 660 554 | 2 | 51 | 2 | | | | 87 | 1 | | | | 26 Drôme | 414 072 | | 2 | | | | | | | | | |
| LANGUEDOC-ROUSSILLON | 11 Aude | 298 712 | | | | | | | | | | | FRANCE MÉTROPOLITAINE | 38 Isère | 1 016 228 | | | | | | | | | | | 5 |
| | 30 Gard | 585 049 | ////// | ////// | Non reçu | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// | | 42 Loire | 746 288 | | | | | | | | | | | |
| | 34 Hérault | 794 603 | | 9 | 1 | | | | 1 | | | | | 69 Rhône | 1 508 966 | ////// | ////// | Non reçu | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// | |
| | 48 Lozère | 72 825 | ////// | ////// | Non reçu | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// | ////// | | 73 Savoie | 348 261 | | | | | | | | | | | 1 |
| FRANCE OUTRE-MER | 66 Pyrénées-Orient. | 363 796 | | 2 | | | | | 1 | | | | | 74 Savoie (Haute-) | 568 286 | | 2 | 1 | | | | | | | | 4 |
| | Total | 2 114 985 | 11 | 1 | | | | | 2 | | | | | Total | 5 350 701 | | 4 | 1 | | | | | | | | 10 |
| | 971 Guadeloupe | 386 987 | | 10 | | | | | 7 | | | | TOTAL DE LA SEMAINE FRANCE MÉTROPOLITAINE | 20 premières semaines de 1995 | 81 | 2 091 | 152 | 37 | 9 | 3 301 | 75 | | | | | |